

■ 大阪大学 <https://www.osaka-u.ac.jp>



豊中キャンパス

06-6850-6111(代表)

- 大学院理学研究科

<https://www.sci.osaka-u.ac.jp>

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1



吹田キャンパス

06-6877-5111(代表)

- 大学院生命機能研究科

<https://www.fbs.osaka-u.ac.jp>

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-3

- 蛋白質研究所

<http://www.protein.osaka-u.ac.jp>

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2

- 微生物病研究所

<http://www.biken.osaka-u.ac.jp>

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-1

- 産業科学研究所

<https://www.sanken.osaka-u.ac.jp>

〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘8-1

■ 連携大学院



JT生命誌研究館

<http://www.brh.co.jp>

〒569-1125 大阪府高槻市紫町1-1

072-681-9750(代表)



理化学研究所 生命機能科学研究センター

<https://www.bdr.riken.jp>

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3

078-306-0111(代表)



情報通信研究機構 未来ICT研究所

https://www2.nict.go.jp/advanced_ict/

〒651-2492 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2

078-969-2100(代表)



<https://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp>





2023年度 大阪大学大学院理学研究科

生物科学専攻研究室案内

あなたにとって「大学院」とは どんな場所でしょうか？

その場所で何を学び、何を得たいですか？

わたしたちはあなたの情熱、意欲に応えられるような大学院でありたいと
思っています。これからみなさんが踏み込もうとしている新しい世界。
「大学院」。その空気を少しでも知ってもらいたくて、この案内を作りました。
これを見たみなさんがこの大学院のことをもっと知りたくなって足を運んで
くださることを願っています。



新しい生物科学の世界へ！


近年の生物科学研究は多くの人の予想を超える早さで進歩しています。さまざまな技術革新、バイオインフォーマティクスやシステム生物学等の新しい方法論の台頭、新しいデータに基づくこれまでの進化系統樹の書き替えなどで表されるように、ますますおもしろい分野になります。生物科学専攻は最先端を追求し、新しい発見に胸をときめかせられるチャンスにあふれています。

大阪大学 理学研究科 生物科学専攻では、三つの柱を立てて 生物・生命の理解に挑戦しています。

1 学際的な広がりを持つ研究体制をとっていること

理学研究科生物科学専攻
蛋白質研究所
微生物病研究所
生命機能研究科
産業科学研究所
化学専攻
高分子科学専攻
理化学生命研究所
JT生命誌研究館
情報通信研究機構未来ICT研究所

生物科学専攻は、基幹講座・協力講座・連携併任講座の三群から構成されています。各群に含まれる36の研究グループの間で密なネットワークを作って、多彩な研究を展開しています。



全ゲノム情報
解読完了！

集団
個体
細胞
超分子・オルガネラ
機能分子

2 国際的に通用する
研究・教育者を育てること
3 原子レベルから個体や集団レベル
までの広い分野の研究を行つて
いること

新しい時代の生物科学研究を目指しましょう！

こうした取り組みは、ポストゲノム時代に突入した生命科学研究の大きな流れの中で注目を集めています。変革の時代にあって、研究力と国際的な視野を備えた研究者の育成を目指しています。生物科学専攻には36の研究グループがあり、100人を超す教員、200人を超す学生が研究を楽しんでいます。生物科学専攻での多くの主要な研究では、学生が中心的な役割を果たしてきました。みなさんが努力すれば、それが必ず報われ、重要な貢献につながります。私たち教員は、みんなの研究の発展をサポートするため、全力を尽くします。

研究に専念できる環境で、知的生活を楽しむ！

大学院では将来の土台作りが大切です。毎週開かれるセミナーでは、科学論文を読んだり研究の内容を議論したりします。各研究室に配属された学生は、専任の指導教員のもとで実験に打ち込みます。豊富な講師陣が行う授業などで専門外の知識を広げるチャンスも多くあります。日々の研究生活で湧いてきた疑問やアイデアをどんどん教員達にぶつけて下さい！

- あらゆる先端実験機器が揃っていて、高度な研究設備を構築しています。
- 専門書や既刊の科学ジャーナルを多数所蔵している複数の図書館があり、ほぼすべてのオンラインジャーナルを自由に利用できます。
- ネットでアクセスが自由に出来、学生1人1人に専用のメールアドレスが支給されます。



充実した教育プログラム

生物科学専攻独自のカリキュラム

専攻の全ての研究グループが講義科目を担当します。専門分野以外の幅広い知識を身につけることができます。サイエンスコア科目では、異なる専門分野の学生数名からなるグループをつくり、教員抜きで、学生同士が切磋琢磨することにより、研究能力、コミュニケーション能力を磨きます。

多彩な大学院プログラム

大阪大学が推進する双翼型大学院教育システムに基き、複数の研究科を横断する多彩なプログラムが立ち上がっています。専門分野を極めるだけでなく、学際融合の推進や社会課題の解決を目指したプログラムに参画することができます。海外での研究活動や学会発表のチャンスもあります。

充実した研究生活サポート

日本学術振興会特別研究員(博士後期課程)
大阪大学フェローシップ(博士後期課程)
次世代挑戦的研究者育成プログラム(博士後期課程)
理工情報系オナー大学院プログラム(博士前期課程)
上記の大学院プログラムからの給付型奨学金
Research Assistant, Teaching Fellow (博士後期課程)
Teaching Assistant (博士前期課程、後期課程)

卒業後の進路 プロの研究者になる！どこでも通用する！

修士号取得のプログラム修了者

多様な職種に就職するチャンスが広がります。
企業の研究所で活躍している人も多数います。
また、博士後期課程に進学して、博士号取得を目指す
という選択肢もあります。

博士号取得のプログラム修了者

大学などの専門機関で研究職に就くチャンスがあります。
リーダー格の教員になる人も増えています。
よりクリエイティブな環境で研究の仕事をしたい人は、是非
後期課程に進学して博士号取得を目指しましょう。

卒業後どこへ行っても、新しい世界で活躍し、良い仕事ができる人材を育成するため、充実した研究教育プログラムを整えています。

熱い探求心を持って、知的生活を思う存分満喫しましょう！


GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE

入試関連情報

Entrance examination related information

柔軟で多彩な研究教育活動を展開するために、広く人材を求めていきます。

生物系に限らず、どのような専攻の出身者も受験可能なように
2つのコースを用意しています。



詳細及び最新情報は、下記 web にて必ずご確認ください

<http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/>

多くの研究室があり、分野も多岐にわたるため、
やりたいことが必ず見つかります。
新しい場所で、あなたの可能性を試してみませんか？

● 入試ガイダンス(予定)

オンラインで開催予定です。各回、同じ内容です。

2023年4月29日(土・祝)10時半から12時

2023年5月27日(土) 10時半から12時

● 研究室紹介

個別にグループリーダーに問い合わせてください。

● 入学試験(予定)

特別入試(自己推薦入試・奨励入試) 口頭試問(午後)

2023年7月1日(土)

一般入試1次募集

2023年8月5日(土) 筆記試験(午後)

2022年8月6日(日) 口頭試問(午後)

一般入試2次募集

2024年2月3日(土)



*最新の入試関連情報は隨時HPに掲載します →

● 入試に関する全般的な問い合わせ先

2023年度 生物科学専攻 教務主任 古屋 秀隆 (ふるや ひでたか) 大阪大学大学院 理学研究科

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1 Tel: 06-6850-5817

e-mail: edugrad @bio.sci.osaka-u.ac.jp

2023年度 生物科学専攻長 昆 隆英 (こん たかひで) 大阪大学大学院 理学研究科

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1 Tel: 06-6850-5435

e-mail: takahide.kon @bio.sci.osaka-u.ac.jp



● 募集要項・出願用紙のダウンロード先→

*詳しくは下記連絡先へ

大阪大学理学部大学院係

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1 Tel: 06-6850-5289

LABORATORIES

生物科学専攻の研究室

● 豊中キャンパス
● 吹田キャンパス
● 連携大学院

Department of Biological Sciences,
Graduate School of Science,
Osaka University

植物科学	植物生長生理学研究室	柿本 辰男 教授 1
	オルガネラバイオロジー研究室	中井 正人 准教授 2
動物発生進化学	細胞生物学研究室	松野 健治 教授 3
	動物形態学研究室	古屋 秀隆 教授 4
	生命誌学研究室	橋本 主税 招へい教授 蘇 智慧 招へい教授 5
神経生物学	分子発生学研究室	古川 貴久 教授 6
	比較神経生物学研究室	志賀 向子 教授 7
	高次脳機能学研究室	疋田 貴俊 教授 8
分子細胞生物学	ゲノムー染色体機能学研究室	篠原 彰 教授 9
	染色体構造機能学研究室	小布施 力史 教授 10
	細胞生命科学研究室	石原 直忠 教授 11
	RNA生体機能研究室	廣瀬 哲郎 教授 12
情報伝達学	1分子生物学研究室	上田 昌宏 教授 13
	分子創製学研究室	高木 淳一 教授 14
	細胞システム研究室	岡田 真里子 教授 15
	蛋白質ナノ科学研究室	原田 慶恵 教授 16
	生体統御学研究室	石谷 太 教授 17
蛋白質機能学	蛋白質結晶学研究室	栗栖 源嗣 教授 18
	計算生物学研究室	水口 賢司 教授 19
	細胞構築学研究室	昆 隆英 教授 20
	生体分子反応科学研究室	黒田 俊一 教授 21
	光合成生物学研究室	大岡 宏造 教授 22
	生物分子機械設計学研究室	古田 健也 招へい准教授 23
蛋白質構造情報学	超分子構造解析学研究室	中川 敦史 教授 24
	電子線構造生物学研究室	加藤 貴之 教授 25
	機能構造計測学研究室	松木 陽 准教授 26
化学生物学	生物分子情報研究室	Li-Kun PHNG 招へい准教授 27
	生体非平衡物理学研究室	川口 喬吾 招へい准教授 28
	機能・発現プロテオミクス研究室	高尾 敏文 教授 29
	蛋白質有機化学研究室	北條 裕信 教授 30
学際	学際グループ研究室	久保田 弓子 准教授 31
		中川 拓郎 准教授	
		今井 薫 准教授	
		浅田 哲弘 助教	
生命機能	生命機能グループ研究室	富永 恵子 准教授 32
生命理学	生物無機化学研究室	船橋 靖博 教授 33
	高分子構造科学研究室	今田 勝巳 教授 34
	超分子機能化学研究室	山口 浩靖 教授 35
	高分子溶液学研究室	寺尾 憲 教授 36

1.

植物生長生理学研究室 理学研究科



教授 柿本 辰男 (Tatsuo KAKIMOTO) kakimoto@bio.sci.osaka-u.ac.jp
 助教 高田 忍 (Shinobu TAKADA) shinobu_takada@bio.sci.osaka-u.ac.jp
 助教 QIAN, Pingping qianpp2013@bio.sci.osaka-u.ac.jp
 助教 坂本 勇貴 (Yuki SAKAMOTO) yuki_sakamoto@bio.sci.osaka-u.ac.jp

URL: https://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/bio_web/lab_page/cell_physiol/sitepg/

植物がどのようにして形を作り上げ、また、環境に応じて成長を調節するのかについて研究しています。植物の成長の際には、適切なパターンを持って細胞が配置されます。そのためには、細胞間のコミュニケーションが必須です。その重要な担い手である植物ホルモンやペプチド性シグナル分子の働きで細胞のパターンが形成される仕組みを調べています。種々の細胞タイプ決定には、転写制御が重要なポイントとなります。そこで発生の鍵となる転写因子を見出し、機能解析を行っています。また、植物は環境に応じて自らの成長や細胞内オルガネラの配置を調整しますが、その仕組みについても研究を行っています。さらに、環境に応答した生態型の進化の研究も行っています。

内鞘細胞のアイデンティティー決定のしくみと側根形成のしくみ

側根形成の最初のステップは内鞘細胞の不等分裂です。内鞘細胞は分化全能性を維持しつつも増殖は停止しています。私たちの研究により、この内鞘細胞の特殊な幹細胞性を作り出している仕組がわかつてきました。また、内鞘細胞が分裂して側根になる過程は、均一な細胞群が組織化された細胞群になる過程、すなわち自己組織化です。これを支える細胞間コミュニケーションの仕組みも研究しています。

維管束のパターン形成

維管束系は、節部、木部および未分化性を持つ前形成層が規則正しく配置しています。転写因子、植物ホルモン、ペプチド性シグナル分子がお互いに調節し合って維管束パターンの形成につながる仕組みがわかつてきました。

環境ストレスに応答した成長制御のしくみ

植物の成長とストレス応答は、しばしばトレードオフの関係にあります。成長とストレス応答の密接な関係を分子レベルで解き明かすとともに、進化の観点からも研究を進めます。

植物細胞が自分の位置を知るメカニズムの解明

多細胞生物の発生では、特定の役割を持った細胞が決まった配置で作られます。しかし、それぞれの細胞が自分の位置を認識して、決まった細胞タイプへと分化するメカニズムの多くは謎のままです。当研究室では、高田忍助教が中心となり、植物の最外層のみにされる表皮に注目して、最外層の位置を認識するセンサーパンク質や、表皮分化を誘導するシグナル伝達経路の同定・解析を進めています。

オルガネラの形態・動態を制御するしくみ

植物細胞の中を見てみると、様々なオルガネラがダイナミックに動き回っていることに気がづきます。私たちは、植物細胞のオルガネラに興味を持ち、蛍

Laboratory of Plant Development

研究室のHPはこちら

2.

オルガネラバイオロジー研究室 蛋白質研究所



准教授 中井 正人 (Masato NAKAI) nakai@protein.osaka-u.ac.jp

URL: <http://www.protein.osaka-u.ac.jp/enzymology/>

動物や植物の体の基本単位は細胞。その細胞の中には、核やミトコンドリア、ペルオキソソーム、葉緑体など、オルガネラと呼ばれる生体膜で囲まれた細胞内小器官があり、様々な代謝を分担しています。では、地球上で最初に誕生した単純な膜構造で囲まれたバクテリア-原核細胞から、どうやって、複雑なオルガネラを持つ真核細胞が生じたのでしょうか。そこには、昔、真核細胞の元となった宿主細胞内に共生したバクテリアがオルガネラ化した長い進化の過程が関わっています。私たちは、植物や藻類の葉緑体を研究対象に、オルガネラ化に伴い確立されてきた蛋白質輸送システムを中心に、その詳細な分子メカニズムと分子進化の解析を通して、真核細胞成立の謎を解き明かします。




図1. 内鞘細胞の持つ側根形成能はPFA/PFB転写因子複合体に支配されている。

内鞘(左図、赤色)は自発的なオーキシンピークの形成、オーキシンに応答した不等分裂と側根原基の組織化能を持っています。私たちは、内鞘細胞が持つこの特有の能力は転写因子複合体PFA/PFBによって作られていることを見出しました。

研究室は、新しいことを発見するための所です。研究においては、それが仮に小さくても自分自身のアイデアや工夫があることが非常に大切です。自分で調べて、考え、人と相談して研究を楽しんでください。

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
TEL&FAX:06-6850-5421



植物の進化をもたらす一因になったことも示唆する事になりました。なぜ、分子量100万もの巨大な膜透過装置が必要となつたのか、どのように成立してきたのか、葉緑体進化の謎に迫ります。




図1. シアノバクテリアの内共生による葉緑体の誕生



図2. 葉緑体包膜のタンパク質膜透過装置の欠損のシロイヌナズナ変異体が示すアルビノ形質




図3. 葉緑体蛋白質輸送に関するメガコンプレックス

志は高く、世界を相手に、
Breakthroughを目指して、
一緒に研究を楽しみましょう!!

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
大阪大学 蛋白質研究所
TEL:06-6879-8612
FAX:06-6879-8613

研究室のHPはこちら



3.

細胞生物学研究室 理学研究科



教授 松野 健治 (Kenji MATSUNO)
 講師 稲木 美紀子 (Mikiko INAKI)
 講師 梅津 大輝 (Daiki UMETSU)

URL: https://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/bio_web/lab_page/matsuno/index.html

複雑な多細胞生物のからだも、元をただせば個々の細胞の集まりです。したがって、生物が「生きる」ことは、細胞の発揮する多彩な機能に依存しています。例えば、細胞は、細胞同士の間で情報のやり取りをすることで、自らの運命を決めています。しかし、細胞がモノスゴイ機能を発揮する機能については、まだわかつていません。

我々の研究室は、動物の組織・器官が、遺伝的にプログラムされた形態につくりあげられていく際に、細胞がどのような機能を発揮しているのかに興味を持っています。遺伝学的解析手段が駆使でき、全ゲノムのDNA塩基配列が決定されているショウジョウバエを用いて、この問題にチャレンジしています。

動物のからだを左右非対称にする細胞のキラリティ

外見が左右対称な動物においても、内臓器官は左右非対称な場合が多くみられます。ヒトの内臓の左右非対称性がそのよい例です。このような左右非対称性形成の形成機構は、進化的に多様であり、無脊椎動物ではその機構はほとんど理解されていません。

ショウジョウバエは、発生の研究を行うのに適した実験動物であり、そのからだは、遺伝的に決められた左右非対称性を示します。我々の研究室は、ショウジョウバエを用いて、左右非対称性が形成される機構を研究しています。その結果、細胞がキラリティ(鏡像がもとの象と重ならない性質)を示し、それがもとになって左右非対称性が形成されることを世界に先駆けて明らかにしました。消化管の左右非対称性が逆転する突然変異体を探索し

Laboratory of Cell Biology




図1.
ショウジョウバエの胚の消化管(部分ごとに、緑、紫、青色で示した)は、左右非対称。左パネルは腹側から、右パネルは背側から見た写真。




図2.
野生型のショウジョウバエ胚の神経系(紫色)ははしご状神経系。Notch受容体をコードする遺伝子の突然変異体の胚では、細胞間の情報伝達が機能せず、細胞分化が乱れる。その結果、本来は表皮の細胞が、全て神経に変化してしまう。

生物学にはまだまだ未開の領域があります。つまり、楽しいことがたくさん残っています。

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
 大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
 TEL:06-6850-5804
 FAX:06-6850-5805



研究室のHPはこちら

4.

動物形態学研究室 理学研究科




教授 古屋 秀隆 (Hidetaka FURUYA) hfuruya@bio.sci.osaka-u.ac.jp
 特任講師 Md. Sayeedul ISLAM islam@bio.sci.osaka-u.ac.jp
 助教 山田 温子 (Atsuko YAMADA) atsukoy@bio.sci.osaka-u.ac.jp

URL: <http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/~hfuruya/japanese.html>

生物の多様な形のもつ意味について、ニハイチュウ(二胚動物門)という多細胞動物を材料とし、生物学的諸特性を明らかにし説明しようとしています。ニハイチュウは底棲の頭足類の腎嚢を生活の場とする数ミリメートルの動物で、尿に満たされた環境で生活するユニークな動物です。この頭足類の腎嚢という微環境で、ニハイチュウの形がどのようにして成立したのか、生活環境、構造、発生、生物間相互作用、ゲノム、進化の観点から総合的に研究を進めています。またニハイチュウなどの寄生虫の生活の場としての頭足類に特徴的な器官構造や頭足類の繁殖戦略に関する形質の進化など、動物の形にこだわった研究を行っています。

明らかにし、この動物が原始的な動物ではなく後生動物であることを知りました。この頭足類の腎嚢という微環境で、ニハイチュウの形がどのようにして成立したのか、生活環境、構造、発生、生物間相互作用、ゲノム、進化の観点から総合的に研究を進めています。またニハイチュウなどの寄生虫の生活の場としての頭足類に特徴的な器官構造や頭足類の繁殖戦略に関する形質の進化など、動物の形にこだわった研究を行っています。



上図:ヤマトニハイチュウの蛍光顕微鏡写真
DAPI染色により細胞核が光って見えている

左図:コンボウニハイチュウの微分干渉顕微鏡写真

下図:マダコの腎臓の表面を走査型顕微鏡で見た写真
腎臓のくぼみにニハイチュウが頭部を挿入している。



〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
 大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
 TEL&FAX:06-6850-5817



研究室のHPはこちら

自然に入り自然を詳細に観察・
スケッチすることに興味のあるみなさん、時間を共有しましょう。

5.

生命誌学研究室 JT生命誌研究館

Laboratory of Biohistory



(左) 招へい教授 蘇 智慧 (Zhi-Hui SU) su.zhihui@brh.co.jp
(右) 招へい教授 橋本 主税 (Chikara HASHIMOTO) hashimoto@brh.co.jp
招へい准教授 小田 広樹 (Hiroki ODA) hoda@brh.co.jp

URL: <https://www.brh.co.jp/>

ゲノムに書かれた生きものの歴史性・多様性・共通性を読み解くことで、生きものの姿(発生・進化・生態系など)を見る実験研究とその成果の表現の研究を行なっている。個別の遺伝子、個別の生物種にこだわらず、多様な生物を見ることにより、発生における形づくりや進化の過程での種分化の基本が見えてくるのではないかと考えている。特徴として、研究の基本に生きものを愛する心を置き、その発信もしている。生命誌学講座では現在、進化生物学と発生生物学に関する以下の研究を行っている。

昆虫と植物の相互作用と進化

生物の相互作用は進化・種分化の原動力の一つである。特に昆虫と植物は餌資源と花粉媒介による相利共生など様々な相互作用をしている。これらの相互作用における相互適応的な関係を築くことによって、昆虫と植物の多様化が促されてきた。我々は昆虫と植物との相互作用における進化・種分化の仕組みを解明している。

昆虫の飛翔機能の退化的進化

翅の獲得は昆虫の進化過程における最重要的イベントで、それは昆虫の多様化にも寄与してきたと考えられている。一方、現生の昆虫類では、翅をなくして飛翔力を失ったものも少なくない。我々は昆虫の飛翔機能の退化的進化の分子メカニズムの解明を目指している。

動物の細胞と発生の仕組みの起源と進化



多細胞動物はからだの基本構造を形作る上皮組織を持ち、からだの軸や反復構造を形作ることで多様な進化を遂げてきた。その多様化の原点にどのような細胞と発生の仕組みが存在したのか、そして、そこからどのような変化が多様化を駆動してきたのか、これらの問題に実験と理論の両面から取り組む。

脊索動物の原腸形成機構

原腸形成運動は、基本体制を確立する重要な発生過程である。さまざまな両生類を用いて我々が構築した原腸形成モデルの視点に立つことで、原索動物から羊膜類に至る動物の原腸形成過程がすべて共通の機構で行なわれている可能性が明らかとなった。さらに詳細な比較によって原腸形成運動に潜在する普遍性について解析している。

細胞周期と細胞分化の制御

分裂中の細胞は分化ができず、分化するためには細胞周期をG0期で止めなければならないことを脊椎動物の神経堤細胞の解析から見出し、同じ機構がプラナリアの細胞においても保存されていることがわかったことから、動物細胞全体に保存されている本質的な分化制御機構ではないかと考え、さらに解析を進めている。



発生、進化、生態など生き物の歴史性と関係性の総合的研究とその表現によって生命研究の新しい姿を創っている生命誌学研究室の一員になり、新しいアイディアを生かした研究をしてください。

〒569-1125 大阪府高槻市紫町 1-1
JT生命誌研究館
TEL:072-681-9750
FAX:072-681-9743

研究室のHPはこちら



6.

分子発生学研究室 蛋白質研究所

Laboratory for Molecular and Developmental Biology



教 授 古川 貴久 (Takahisa FURUKAWA) takahisa.furukawa@protein.osaka-u.ac.jp
准教授 茶屋 太郎 (Taro CHAYA) taro.chaya@protein.osaka-u.ac.jp
助 教 Hung-Ya TU hung-ya.tu@protein.osaka-u.ac.jp

URL: http://www.protein.osaka-u.ac.jp/furukawa_lab/

当研究室は、モデル生物としてマウスを用いて、分子生物学、発生工学、組織学、生理学など幅広い方法論を駆使して脊椎動物の中枢神経系発生の分子機構を解明し、神経系の構築と機能発現の原理を解明することを目指しています。染色体ゲノムに刻まれた遺伝プログラムが、どのように多様な神経細胞を作り、正確な神経回路を形成し、生体での神経生理機能につながるのかを網膜視覚系を主なモデルシステムとして研究を進めています。さらに、遺伝子から生理機能までの各ステップの異常がどのように人の病気につながり、それをどのように解決できるかといった医学的問題への貢献も積極的に進めています。私たちは、中枢神経系発生の「遺伝子から個体生理機能・ヒト疾患までの統合的解明」を目指しています。

シナプス形成の分子機構の解析

網膜は中枢神経系の組織であり、美しい層構造を形成し形態学的にシンプルでニューロンの形態も明瞭です。シナプスの位置も明確に決まっており、電子顕微鏡によるシナプス末端の正確な検証も可能です。近年、軸索がどのように標的に向かい伸張するのかといったメカニズムの理解は比較的進んできましたが、正確な回路を作るための特異的シナプス結合の分子機構はまだよく分かっていません。私たちは、新規細胞外マトリックス蛋白質ピカチュリンを単離し、ピカチュリンがジストログリカンと結合することで視細胞—双極細胞間の特異的シナプス形分子として機能することを見出しました。私たちは、網膜のシナプス形成や神経回路形成の分子機構の解明を進めています。

ノンコーディングRNA(non-coding RNA)による中枢神経系の発生と機能制御メカニズムの解析

近年、様々な生物種で、18-25塩基程度の小さなRNA、マイクロRNA(miRNA)が数多く転写されていることがわかつてきました。マイクロRNAは相補的な配列をもつターゲット遺伝子の発現を抑制し、発生、分化、代謝、神経、発がんなどの様々な生体現象に関わっていると考えられています。私たちは、中枢神経特異的な発現を示すマイクロRNA-124aが海馬の正常な神経回路形成や網膜錐体細胞の生存に必須であることを明らかにしました。私たちは中枢神経系に発現するマイクロRNA群や長鎖ノンコーディングRNAが重要な機能を担っていると注目しており、ノンコーディングRNAの生体機能や作用機構を解明することによって、中枢神経系の新たな遺伝子制御機構を明らかにすることを目指しています。

ニューロン分化に関する分子システムの解析

ヒト脳に存在する1千億個とも言われるニューロンの細胞運命はどのように正しく決定されるのでしょうか?エピジェネティックな要素はどれくらい効いているのでしょうか?私たちは網膜の光を受け取るニューロンである視細胞に注目し、視細胞がどう運命決定されるのかを転写制御の観点から明らかにしてきました。私たちは視細胞の運命決定が「転写因子の連鎖活性化」によることを発見しました。さらに網膜神経細胞の発生に関わる遺伝子制御の解明を進めており、網膜神経細胞をモデルにニューロンの運命決定から最終分化までのメカニズム全貌を生体レベル(*in vivo*)で明らかにすることを目指しています。

これ以外にも進行中のプロジェクトがいくつかあります。興味のある方は是非お問い合わせください。




図1. 超高圧電子顕微鏡による網膜リボンシナプスの三次元トモグラフィー解析。ピカチュリンKOの網膜のリボンシナプスには双極細胞の神経終末が進入していない





図2. miR-124a欠損マウス(KO)の脳では、海馬歯状回の苔状線維とCA3錐体細胞の回路形成が正しい位置で形成されず、苔状線維のCA3領域への異常侵入が認められた

研究すればするほど、生物のとんでもなく精緻で奥深い仕組みに驚嘆するばかりです!
一緒に生命の驚異を明らかにしていきませんか?

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
大阪大学 蛋白質研究所
TEL:06-6879-8631
FAX:06-6879-8633



研究室のHPはこちら

7.

比較神経生物学研究室 理学研究科



教授 志賀 向子 (Sakiko SHIGA) shigask@bio.sci.osaka-u.ac.jp
 助教 長谷部 政治 (Masaharu HASEBE) h.masaharu@bio.sci.osaka-u.ac.jp
 助教 濱中 良隆 (Yoshitaka HAMANAKA) hamanaka@bio.sci.osaka-u.ac.jp
 助教 坂口 愛沙 (Aisa SAKAGUCHI) sakaguchiaisa.celas@osaka-u.ac.jp
 特任助教 西 吉利 (Xijier) xijier@cm.bio.sci.osaka-u.ac.jp
 URL: https://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/bio_web/lab_page/shiga/

私たちは、自然選択の中で洗練されてきた動物の行動や生理を、神経系のしくみから解き明かすことを目的とし、研究を行っています。特に、脳や神経系が時間軸を持った情報を処理するしくみに興味をもっています。昆虫や巻貝などの無脊椎動物が、概日時計を使って、環境の光周期情報(明るい時間と暗い時間の組み合わせ)から季節を知るしくみや、概日時計が24時間の倍数のリズムを作り出すしくみを解き明かそうとしています。多様な動物の行動や生理を比較し、その共通性と多様性を知ることは、個々の動物が進化してきた道筋を探ることにもつながると考えています。

昆虫の光周期と休眠

鳥のさえずりや渡り、哺乳類の冬眠など、多くの動物はその行動や生理を季節に合わせて、生活しています。昆虫も、生存に適した季節に成長や生殖をおこない、不適切な季節にはそれらを一時的に停止した休眠に入ります。動物が季節に適応するためには、これからやってくる季節を正確に予測し、それに備える必要があります。脳では、季節を知る手掛かりとなる日長を概日時計を用いて測定し、さらにその日数を数えることにより季節が判断されると考えられています。そして、季節に合わせた発育プログラムが決定され、内分泌機構を介して成長、生殖、休眠が調節されます。

野外から昆虫を採集し、研究に使う

私たちは、野外から採集してきたハエやカーメムシを実験室で飼育して、光周期や休眠調節の神経機構を調べています。ルリキンバエやホソヘリカメムシの成虫は、長日により

Laboratory of Comparative Neurobiology





図2 ホソヘリカメムシ脳内の概日時計細胞(青)とその周囲にあるpigment-dispersing factor免疫陽性細胞(緑)と光周期光入力経路にあると考えられるanterior lobula neuron(マゼンタ)

生物の多様性には驚くばかり。まだ誰もやっていない研究には夢がある。一緒にチャレンジしよう。

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
 大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
 TEL:06-6850-5423

研究室のHPはこちら



8.

高次脳機能学研究室 蛋白質研究所



教授 足田 貴俊 (Takatoshi HIKIDA) hikida@protein.osaka-u.ac.jp
 助教 Tom MACPHERSON macpherson@protein.osaka-u.ac.jp
 助教 小澤 貴明 (Takaaki OZAWA) takaaki.ozawa@protein.osaka-u.ac.jp

URL: <https://sites.google.com/site/takatoshihikidalaboratory/home>

精神神経疾患の分子病態の解析

多くの精神神経疾患で、その分子病態が明らかになっておらず、根本的な治療法の開発が遅れています。私たちは精神疾患患者でみられる遺伝子変異を導入したマウスを精神疾患モデル動物として、そのマウスでみられる異常を、行動、回路、分子の各階層で解析することによって、精神疾患の分子病態の解明を進めています。さらに社会環境などの要因を負荷することで、遺伝と環境の相互作用からみた発症のメカニズムに迫っています。




図:マウスの認知学習課題

高次脳機能の神経回路機構の解析

私たちはマウスにおいて大脳基底核神経回路の特定の神経伝達を制御する手法を開発し、認知学習行動において特定の神経回路がそれぞれ固有の役割を担っていることを示していました。マウスの認知課題(図)などを用いて高次脳機能における神経回路の制御機構の解明を進めています。また、本能行動や社会行動の神経回路機構についても解析を行います。神経回路制御には独自に開発した可逆的神経伝達阻止法に加えて、光遺伝学的手法、薬理遺伝学的手法を用います。行動下のマウスでの特定神経細胞の活動を可視化し、脳内顕微鏡やファイバーフォトメトリ法を用いて観察します。



図. ファイバーフォトメトリ法により、行動下のマウスの特定神経細胞の活動を観察する

脳の仕組みと一緒に
明らかにしていきましょう。

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
 大阪大学 蛋白質研究所
 TEL:06-6879-8621
 FAX:06-6879-8623



研究室のHPはこちら

9.

ゲノムー染色体機能学研究室 蛋白質研究所



教授 篠原 彰
(Akira SHINOHARA)
准教授 古郡 麻子
(Asako FURUKOHRI)
助教 伊藤 将
(Masaru ITO)

URL: <http://www.protein.osaka-u.ac.jp/genome/>

DNA鎖の交換反応である相同組換えはゲノム構造の安定化や多様性の產生に大切な役割を果たしています。体細胞分裂期にはDNAの傷の修復に、減数分裂期には染色体の分配に必須の役割を果たします。ゲノムの不安定化はガンの直接の原因であり、配偶子形成過程では不妊、流産、ダウン症などの異数体病の原因になります。当研究室では体細胞、減数分裂期の組換え反応によるゲノムの安定化の分子メカニズムとその制御、その破綻によって生じるガンなどのゲノム病態を解明するために、酵母細胞やヒト培養細胞を用いて、これらの過程に働く遺伝子、蛋白質の機能を分子生物学的、遺伝的、細胞生物学的、生化学的手法などあらゆる方法論を用いて研究を行っています。

真核生物の相同組換えに関わる蛋白質の解析

体細胞分裂期では相同組換えはDNA障害の修復に重要な役割を果たします。組換えはDNAの2重鎖切断で開始し、そのDNA2本鎖末端が削られて生じる1本鎖DNAを利用して、相同な2本鎖DNAを探す出反応です。この反応には大腸菌ではRecA、真核生物ではそのホモログのRad51が単鎖DNA上に作る右巻の螺旋構造体が関わると考えられています(図1)、その詳細については不明な点が多くあります。真核生物ではRad51 フィラメントの形成は厳密に制御されています。さまざまな因子が必要なことが分かれています。例えば、最近同定された家族性乳癌の原因遺伝子Brca2や我々が同定して構造を決めたCsm2-Psy3複合体(図1)もRad51フィラメント形成を助ける補助因子です。我々はRad51のフィラメント形成とその機能を分子レベルで解明することを目指しています。同時に減数分裂期特異的なRecAホモログであるDmc1とその制御因子の解析も行っています。




図1.組換えに関わるRad51フィラメント形成がCsm2-Psy3により促進される仕組み

染色体構造変化による減数分裂期の組換えの制御の分子機構

配偶子形成に必要な減数分裂ではDNA複製の後、核分裂が2回連続して起こり、第1分裂期では相同染色体が分配されます。分配を促進するため、相同染色体の間に物理的な結合を生み出すのが、相同組換えです。減数分裂期の相同組換えは、染色体の入れ替えを伴う交叉型組換えの形成を伴い、その数と分布が制御されています。また、減数分裂期には動的な染色体の構造体形成と染色体の再配置が組換えに伴って起こります。特に相同染色体をペアリングするシナプトネマ複合体(図2)、テロメアが核膜上で一ヵ所に集まるブーケ形成(図3)が知られています。減数分裂期の組換えと染色体構造との関連性から、染色体上で起こるDNAの生化学反応の分子機構についての新規概念を生み出すことを目指しています。




図3. 減数分裂期のテロメアのクラスタリング(ブーケ形成)。ブーケ形成ではテロメア(緑)が核の周辺部(上図)から一ヵ所(下図)に集まる。赤は組換えに関わる蛋白質の局在

ヒト細胞やマウス個体での相同組換えのメカニズムとその破綻による細胞癌化の解析

最近ではゲノムの不安定化による細胞の癌化と組換えが注目されています。高等真核生物の組換えの分子メカニズムを解明するために、ヒト細胞やマウス個体での相同組換えを解析する系を立ち上げています。特に、ヒト相同組換えに関わる因子の解析、ノックアウトマウスの作成と解析などを通して、ヒト細胞の中での組換えの分子メカニズムやその破綻による染色体異常を伴う異常(図4)に関する解析を行っています。




図4. マウス減数分裂期の染色体と組換え結節

志が高く、熱意のある人、
世界で注目されるような
研究を目指しましょう。




図2.シナプトネマ複合体。シナプトネマ複合体の蛋白質が線状(緑、赤)とDNA(青)に分布し、この構造体上で相同染色体が対合する

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
大阪大学 蛋白質研究所
TEL:06-6879-8624
FAX:06-6879-8626
研究室のHPはこちら

10.

染色体構造機能学研究室 理学研究科



教授 小布施 力史
(Chikashi OBUSE)
准教授 長尾 恒治
(Koji NAGAO)
助教 磯部 真也
(Shinya ISOBE)

URL: https://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/bio_web/lab_page/obuse/

わたしたちの体は、同じ遺伝情報を持つ60兆個もの細胞が、2万種類ある遺伝子の機能発現を組み合わせて、200種類以上の細胞に分化することでできあがっています。遺伝情報を担うDNAは、様々なタンパク質やRNAと結合してクロマチンを形成して核の中に収められています。わたしたちの研究室では、おもにヒト細胞について、遺伝情報を担うDNAがどのように様々なタンパク質やRNAと協働して、核の中に納められ、次世代に受け継がれ、適切に使われるのかについて、分子レベルで明らかしようとしています。そのため、遺伝子操作やゲノムエディティング、タンパク質の機能構造解析、顕微鏡を用いたイメージング、さらに、次世代シーケンサーや質量分析器を用いたオミクスなど様々な手法を取り入れて、アプローチしています。

エピゲノムはどのように次の世代に伝えられ、どのように書き換えられるか

近年、細胞の分化や刺激に応答した遺伝子の機能発現は、DNAのメチル化、ヒストンの化学修飾など、クロマチンにつけられた印、いわゆるエピゲノムにより支配されていると考えられるようになってきました。これらの印は、DNAの塩基配列を書き換えることなく、次の世代に受け継がれたり、書き換えたりすることができます。受精卵というたった一つの細胞は、様々な細胞を経て最終的な細胞に分化します。この間、DNAに書かれた遺伝情報は細胞分裂にもなって正確に受け継がれながら、分化を方向づけるエピゲノムは書き換えられます。一方で、分化した状態を維持するためにエピゲノムが細胞周期と連動して正確に次の世代に受け継がれる必要があります。わたしたちは、ヒト細胞から独自に見出したタンパク質を手掛かりに、これらの仕組みについて解明しています。

エピゲノムの情報がどのようにクロマチンの高次構造に変換されるか

エピゲノムを担うDNAのメチル化や、ヒストンの化学修飾などの印は、クロマチンの高次構造に変換されることによって遺伝情報の発現制御をしていると考えられています。例えば、凝縮したクロマチン構造は、転写因子がDNAに近づくことを妨げ転写を抑制します。わたしたちは、エピゲノムの印がどのようにしてクロマチン構造に変換されるのか、その仕組みの解明について取り組んでいます。一例として、女性を持つ不活性X染色体は、まるごと1本凝縮したクロマチン構造をとっています。わたしたちは、自ら見つけたタンパク質がエピゲノムの印を読み取って、RNAと協働して、この凝縮したクロマチン構造を形作っていることを世界で初めて明らかにしました。

エピゲノムを司る仕組みの破綻による疾患

エピゲノムを司る仕組みの破綻は、様々な疾患を引き起します。例えば、私たちが見出した不活性X染色体の凝縮に関わるタンパク質の機能不全は、ある種の筋ジストロフィーを引き起すことが明らかになってきました。わたしたちが行っているエピゲノムの仕組みの理解は、病因・病態の理解につながり、ひいては、診断や治療に貢献することが期待されます。

オミクスを用いたエピゲノム研究

わたしたちの研究室では、ゲノムの配列情報を活用した網羅的な解析法を駆使して研究をしています。例えば、質量分析計を用いれば、ごく微量のタンパク質さえあれば、その名前がわかります。この技術を使ってエピゲノムの仕組みに関わる新しいタンパク質を次々と発見しています。また、次世代シーケンサーを用いた解析により、わたしたちが発見したタンパク質がクロマチン上のどこでどのような機能を果たしているのか知ることができます。




図1 DNAはヒストンなどのタンパク質やRNAとともにクロマチンに形成し核の中に収められています

H3K9me3
H3K27me3




図2 女性の不活性化X染色体(矢頭)とそのエピゲノムの情報




図3 オミクスを用いた網羅的解析のための装置
エピゲノムの制御はさまざまな生命現象に
関わっています。この仕組みはまだまだ謎
に満ちています。
一緒に謎解きにチャレンジしましょう!


〒560-0043 大阪府豊中市侍兼山町1-1
大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
TEL:06-6850-5812



研究室のHPはこちら

11.

細胞生命科学研究室 理学研究科



教授 石原 直忠 (Naotada ISHIHARA)

助教 小笠原 絵美 (Emi OGASAWARA)

特任助教 松島 雄一 (Yuichi MATSUSHIMA)

URL: <https://mitochondria.jp/>

Laboratory of Cellular Life Science

ミトコンドリアは細菌の共生を起源とした細胞小器官です。ミトコンドリアは酸素呼吸によるエネルギー生産、代謝、細胞死制御などの多様な機能を介して、病態や老化などの高次生命機能に関与しています。生細胞観察を行うと、細長く枝分かれしたミトコンドリアが、細胞内で活発に動き、「分裂」と「融合」を繰り返す様子を観察できます(図1)。また、ミトコンドリアはその内部に自身の遺伝子(mtDNA)を持っており、その細胞内での配置や形態が動的に変動する様子を観察できます。しかし、これらのミトコンドリア構造の動的特性の分子詳細と、その役割に関してはまだ未解明な点が多く残されています。

私たちの研究グループでは、哺乳動物細胞のミトコンドリアの形と動き、特にミトコンドリアの分裂と融合、またmtDNAの動態に着目して研究を進めています。

哺乳動物ミトコンドリアの融合反応

私たちはミトコンドリアを蛍光蛋白質で標識し生細胞観察を行うことで、ミトコンドリアは頻繁に融合し、その内容物を交換できることを見出しています(図2)。ミトコンドリア融合の詳細を理解するために、精製したタンパク質を用いた生化学的・生物物理学的解析や、哺乳動物培養細胞の生細胞観察を行っています。ミトコンドリアの活性に伴い融合活性が制御され「働きの悪いミトコンドリアを排除」する、ミトコンドリアの品質管理機構を見出しています。

ミトコンドリア分裂の生体内での機能
ミトコンドリアは細菌の共生を起源にしたオルガネラですが、哺乳動物では細胞型の分裂装置は失われ、共生後に新たな分裂システムを獲得しました。私たちはミトコンドリア分裂因子の欠損マウスを構築することで、個体内での高次生命機能を解析しています。初期発生や神経細胞においてミトコンドリアの適切な配置が必要であること、卵子の機能維持にも重要であることなどがわかつきました。

さらなる解析から、統合的な高次生命機能への関与を見出します。

ミトコンドリアDNAのダイナミクス

ヒトでは、細胞あたり数百コピー以上の環状のmtDNAを保持しています(図3)。私たちはmtDNAのライブイメージング系を構築しており、ミトコンドリアの膜とDNAは協調的に制御されていること、mtDNAの配置が心筋の成長など個体レベルでも重要な役割を持つことなどを明らかにしています。このmtDNAの個体内での遺伝様式を知ることは、病気や老化におけるミトコンドリアの役割を知るうえで重要な意味を持つのではないかと考えて研究を進めています。

ミトコンドリアの動きを眺め続けています。面白くて役に立つ、ミトコンドリアの謎と一緒に解き明かしましょう



図1 ミトコンドリアの2重膜の融合と分裂のモデル図




図2 生きた細胞の中のミトコンドリア融合を蛍光顕微鏡で可視化した実験





図3 哺乳動物細胞のミトコンドリアとmtDNA 蛍光顕微鏡で観察すると、長い枝分かれしたミトコンドリア(赤)とドット状のmtDNAの核様体(緑)が観察される(青は微小管)

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
TEL:06-6850-6706



研究室のHPはこちら

12.

RNA生体機能研究室 生命機能研究科



教授 廣瀬 哲郎 (Tetsuro HIROSE)

特任講師 山崎 智弘 (Tomohiro YAMAZAKI)

特任講師 二宮 賢介 (Kensuke NINOMIYA)

URL: <http://hirose-lab.com/>

Laboratory of RNA biofunction

今世紀初頭のポストゲノム解析によって、ゲノムの大部分を占める非コード領域から大量のノンコーディングRNA(ncRNA)が産生されていることが明らかになり、その機能に大きな注目が集まっています。私たちの研究室では、ncRNAの生体機能を明らかにし、その働きを規定する新たな遺伝暗号ルールを解明することによって、ゲノム機能概念を再構築することを目指しています。特に、これまで私たちが明らかにしてきたncRNAが誘導する相分離現象による細胞内構造体の形成機構やその役割について、基礎的な分子・細胞生物学研究に生物物理学や情報科学などの手法を取り込んで研究しています。

ノンコーディングRNAが誘導する細胞内相分離の解析

ncRNA暗号が規定している機能として、私たちはncRNAによる細胞内構造体の構築機能に注目しています。真核細胞の核内には膜に包まれていない非膜性構造体が多数存在し、重要な機能を果たしています(図2)。このうちいくつかの構造体がncRNAを骨格として構築されることが私たちの研究によって明らかになりました(図3)。最近これらの非膜性構造体は、液滴やゲルのような性質を持ち「液-液相分離」と呼ばれる物理現象によって形成されることがわかつきました。つまりncRNAは、核内空間で相分離を誘発するシード分子として働いているようです。そこで私たちは、相分離を介して形成される巨大で秩序だった非膜性構造体がどのように構築されていくのか、特に相分離を直接担う天然変性タンパク質の機能解明やそれらを集約するためのncRNA暗号の解読を目指しています。

細胞内相分離の意義に関する研究

相分離は膜を使わずに細胞内空間を区画化する巧妙な機構です(図3)。そこで相分離によって形成された構造体内でどのようなことが起こっているのか、RNA分子を構造骨格として用いる意義は何か、ストレスや細胞分化などの条件下で相分離がどのように制御されているか、そしてどのような生理現象の制御に関わっているかなど、謎に満ちた相分離現象をRNA機能を通して解明しようとしています。

RNAの研究は、これまで幾度も生物学の常識を書き換えて新しい研究潮流を作ってきました。今世紀に入り謎に満ちた新たなRNA世界が見えてきました。この謎に挑戦しようというロマンチックで活力に溢れた学生さんを歓迎します。




図1. ポストゲノム解析によってヒトゲノムの98%を占める非コード領域から数万種類のncRNAが産生されていることが明らかになった。その機能はほとんど未知のままである。




図2. 哺乳類細胞核の非膜性構造体の模式図




図3. ncRNAによる非膜性構造体の構築機能。ncRNAが一群の天然変性タンパク質を集約して相分離を誘発し、非膜性構造体を形成する。形成された構造体の働きとして、反応るつば、係留、構造ハブの3つの制御機能が提唱されている。

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-3
大阪大学大学院 生命機能研究科
TEL:06-6879-4675



研究室のHPはこちら

13.

1分子生物学研究室 生命機能研究科



教授 上田 昌宏 (Masahiro UEDA) masahiroueda@fbs.osaka-u.ac.jp
 准教授 有賀 隆行 (Takayuki ARIGA) ariga.fbs @ osaka-u.ac.jp
 助教 松岡 里実 (Satomi MATSUOKA) matsuoka@fbs.osaka-u.ac.jp

URL: <https://www.fbs.osaka-u.ac.jp/labs/ueda/>


細胞は様々な生体分子から構成された複雑なシステムです。蛋白質や核酸、脂質などの生体分子を要素として運動機能・情報処理機能・増殖機能などを有するシステムが自律的に組織化され、変動する環境に対して巧みに適応することができます。近年の高度な顕微鏡技術の進展により、生きた細胞の中で働く生体分子1つ1つを観察することができるようになってきました(1分子イメージング技術)。我々の研究室では、こうした最先端のイメージング技術と数理モデリング、及び、細胞を創ることを目指した合成生物学の手法を細胞内のシグナル伝達システムに適用し、生物らしい機能が発現する仕組みを1分子粒度の解像度で解明することを目指しています。

細胞内1分子イメージング法の開発


細胞内1分子イメージング法は開発されて10年以上が経ちますが、現在でも1分子顕微鏡による画像データの取得や解析には多くの人手と時間を要します。また、職人的な実験技術と専門性の高い統計解析法が必要とされており、新たに1分子研究を始めようとする方々にとって大きなバリアとなっています。そこで我々のグループでは、ハイスクロット化された細胞内1分子イメージング自動解析システムの開発を進めています。こうした技術開発を通して、細胞内1分子イメージング解析法を生命科学に真に実用的な計測技術にしたいと考えています。

走化性シグナル伝達システムの1分子生物学

細胞は環境にある化学物質の濃度勾配を認識し、その物質に近づく(或い



誘引物質の濃度勾配に対して走化性を示す細胞性粘菌*Dictyostelium discoideum*のアメーバ細胞



走化性シグナル伝達システムを構成する分子の細胞内1分子イメージング。白い1点1点がPTENと呼ばれる分子の1分子である。PTENに蛍光色素を付けて観察している。

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-3
 大阪大学大学院 生命機能研究科
 TEL: 06-6879-4611

いっしょに
研究しよう!

研究室のHPはこちら



14.

分子創製学研究室 蛋白質研究所

Laboratory of Protein Synthesis and Expression



教授 高木 淳一 (Junichi TAKAGI)
 准教授 有森 貴夫 (Takao ARIMORI)

takagi@protein.osaka-u.ac.jp
 arimori@protein.osaka-u.ac.jp

URL: <http://www.protein.osaka-u.ac.jp/rcsfp/synthesis/>

細胞は外からの刺激を受容してその情報を細胞内で処理し、外的環境にたいしてどう対処するかを決定する。「シグナル伝達研究」において、受容体(レセプター)が細胞表面(つまり細胞の外)で情報を受容し、それを細胞膜を隔てた内側に伝える仕組みを知ることはもっと重要な課題である。本グループでは、この問題に取り組むために、X線結晶解析や電子顕微鏡イメージングを駆使した構造生物学的アプローチによって、シグナル伝達の「入力端末」部分の働きを明らかにすることを目指している。特に、脳・神経系で働く受容体やシナプス構成因子、神経細胞死や軸索ガイダンスに関わる分子、生物の発生や形態形成に関わるシグナル分子などの蛋白質について、「構造から機能に迫る」研究を行う。

レセプター・リガンド複合体の構造決定

レセプターの細胞外領域(ドメイン)とそのリガンド蛋白質との複合体の構造は、シグナル伝達機構の解明のみならず阻害剤などの医薬の開発にもつながる重要な情報を含んでいる。相互作用に関わる部位やその結合における役割などを明らかにするため、このような複合体の構造を①X線結晶解析を用いて高解像度で、あるいは②電子顕微鏡(EM)イメージングを使って低解像度ながらも複数のコンフォーメーションを同時に決定する。

i) 神經ガイダンス因子とその受容体のシグナリング系神經軸索ガイダンス因子であるセマフォリンとその受容体プレキシンについて、複合体の構造解析から医薬候補となる阻害剤の探索、その作用機序の構造生物学的解明を行っている(図1)。




図1:セマフォリン・プレキシン複合体の結晶構造(左)とセマフォリン刺激前後の細胞の形態(中)、プレキシンB1とその阻害剤ペプチドの結合部位(右)



図2:Wnt3aの結晶構造(左)とLRP6のクライオ電顕構造(中央)を組み合わせた、シグナリング複合体の予想構造(右)




図3:超高親和性アフィニティ精製システム“PAタグ”的開発




図4:新規小型抗体フォーマット“Fv-clasp”的構造
 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
 大阪大学蛋白質研究所

TEL: 06-6879-8607
 FAX: 06-6879-8609



研究室のHPはこちら

蛋白質研究は伝統工芸だ!

15.

細胞システム研究室 蛋白質研究所



教 授 岡田 真里子 (Mariko OKADA) mokada@protein.osaka-u.ac.jp
 助 教 飯田 溪太 (Keita IIDA) kiida@protein.osaka-u.ac.jp
 助 教 市川 彩花 (Ayaka ICHIKAWA) a-ichikawa@protein.osaka-u.ac.jp

URL: http://www.protein.osaka-u.ac.jp/cell_systems/index.html

生命は遺伝子の活性が時間とともに変化する時間発展型のシステムとして考えることができます。私たちは、生命の最小単位である細胞の遺伝子間相互作用ネットワークをシステムとして捉え、その動態の変化に着目した研究を行っています。シグナル伝達系、転写因子の活性、ヒストン修飾、クロマチン開閉、遺伝子発現など、種類と時間スケールが様々に異なる反応を連続反応として考え、細胞における入力(信号)と出力(細胞形質)の関係を明確に記述することを目指しています。細胞制御を定量的かつ網羅的に理解するために、バイオインフォマティクスや数理モデルを用いて、細胞内の遺伝子ネットワークとその制御機構を明らかにします。

細胞の増殖と静止の決断シグナルによる細胞周期制御

ErbB受容体シグナル伝達系は、細胞増殖、分化、細胞死に関与する重要なシグナル伝達系の一つで、この受容体の過剰発現や変異は多様ながんを引き起こすことが知られています(図1)。がんは細胞の異常な増殖により引き起こされますが、一方で、ErbB受容体がどのように細胞周期を制御しているのか、その全体像は明らかになってしまいません。例えば、細胞周期の動態には、2つの大きな特徴(周期性と不可逆性)がありますが、受容体活性化の量の違いが、細胞周期動態のどの部分を変えているのかは不明です。当研究室では、細胞増殖の量的なメカニズムを明らかにするために、細胞周期の周期性を決めるサイクリンタンパク質の転写ネットワークを含めた数理モデル解析とイメージングを中心とした定量解析を進めています。異なる種類のがんの増殖メカニズムが、たった一つの数理モデルで説明できるようなモデル構築を進めています。

数理モデルを用いた疾患データ解析と薬剤感受性の予測

がんなどに代表される疾患は、環境因子と遺伝因子の複数の要素が時間をかけて複雑に絡み合った動的なネットワークとして捉えることができます。そのため、ある時間点で特定の疾患遺伝子マーカーの有無で分類を行っても、各患者によって予後が大きく異なるため、新たな分類指標や薬剤感受性の予測法が必要でした。そこで、当研究室では、細胞内の遺伝子ネットワークの数理モデルを各患者由来の臨床データ解析と組み合わせてシミュレーションを行い、その結果をもとに疾患を分類することができる新しい疾患分類手法(イン・シリコ患者固有モデル)の構築を行っています(図2)。この手法により、乳がんにおいて一般的に予後が悪いとされていた患者群の中に予後の良い患者群があることや特定の薬剤に対する感受性の高さが示唆されました。また、この研究では遺伝子ネットワークの最適なモデル構築のため、自然言語処理の手法構築や深層学習を利用したパターン分類など、様々な情報解析技術を疾患の分類に適用する試みも行っています。

オミクス解析とオミクス解析の要素技術の開発

細胞内の環境応答を網羅的に調べるために、次世代シーケンス解析も積極的に行っています。特に、遺伝子発現の調節機構であるエンハンサー制御に注目することによって、細胞の応答や遺伝子発現を定量的に予測できるようになりました。また、一細胞シーケンスデータの解析により細胞の不均一性に潜む原理なども明らかになりつつあり、情報数理学的な要素技術開発にも取り組んでいます。




図1. ErbB受容体シグナル伝達系による細胞周期制御




図2. 患者固有モデリングの概要
生化学反応の説明文から式を介さずに数理モデルを構築し、パラメータを決定する。新たな数理モデルの手法を構築した。がん患者由来の遺伝子発現データを入力すると、患者固有の薬剤応答などのシミュレーションが可能となる。

私たちの研究室では、実験と計算・数理モデルを合わせた新しいかたちの生物学研究を進めています。基礎研究のみならず、疾患の発症メカニズムのためにも、次世代シーケンスなどによって得られる遺伝子情報を解析する能力は今後、社会でますます必要になっていきます。実験研究のみならず、プログラミングや数学に興味のある受験生は当研究室に見学に来て下さい。

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
大阪大学蛋白質研究所
TEL:06-6879-8617
FAX:06-6879-8619



研究室のHPはこちら

16.

蛋白質ナノ科学研究室 蛋白質研究所

Laboratory of Nanobiology



教 授 原田 慶恵 (Yoshie HARADA) yharada@protein.osaka-u.ac.jp
 准教授 鈴木 団 (Madoka SUZUKI) suzu_mado@protein.osaka-u.ac.jp

URL: <http://www.protein.osaka-u.ac.jp/nanobiology/>

私たちのからだは、たくさんの細胞からできています。それぞれの細胞が正しく機能することで私たちは健康に生きることができます。細胞の中はどのような状態にあるのか、何が起こっているのかを知ることは、生命を理解するためにとても重要です。そこで私たちは、小さな蛍光ダイヤモンド粒子を使って細胞内のナノ領域の環境を計測する方法の開発、細胞内の局所温度を計測し、温度変化が細胞機能にどのような影響を及ぼすのかについて調べる研究を行っています。また、個々の細胞からのタンパク質の分泌を実時間イメージングすることができる蛍光顕微鏡を提供し、複数の研究室と共同研究を行っています。

細胞内局所温度計測技術の開発

体調が悪いとき、まず体温を測ることが多いと思います。このように、温度は私たちの体にとって重要な生理的パラメータです。いっぽう温度は物質の状態を表す基本的な物理的パラメータの一つとして、体内におけるあらゆる反応を支配しています。そこで私たちは、一つ一つの細胞の温度変化に着目し、それが細胞の機能や、臓器から個体といった、より高次の生命現象に与える意義の解明を目指しています。のために、各種の細胞用の温度計を新規に開発し、様々な蛍光イメージング技術を組み合わせて、細胞の温度変化を測定する“細胞内温度イメージング法”を開発してきました。そして例えば、一つの細胞の中で、核と細胞質とでは温度が異なり、核の温度の方が高いことを示唆する結果を報告しました(図1)。これらの結果から、細胞内の局所温度と細胞機能との関連性が伺えます。また細胞内温度イメージング法を活用して、温熱療法の細胞レベルでの評価といったバイオメディカル分野への応用も進めています。

蛍光性ナノダイヤモンドによる細胞の量子センシング

細胞内ナノ領域の環境(温度・磁場・電場など)が生命現象に与える影響を知るために、それを計測可能なセンサーの開発が不可欠です。そのようなセンサーとして、蛍光性ナノダイヤモンド(FND)が近年注目を集めています(図2)。FND内部に存在する格子欠陥の一種である窒素空孔中心(NVC)は非褪色性の安定な蛍光を発し、また、NVC内部の電子スピントリオメトリの量子状態はNVC周囲の環境を鋭敏に反映し蛍光信号へと投影されます。このような性質を利用してすることで、FNDは細胞内ナノ領域の物理量を定量的に計測可能な“量子センサー”として応用可能です。私たちはこれまでに、細胞内ナノ領域の温度計測および熱伝導計測に成功しました。現在は、FNDの表面を化学的にコントロールすることによってその機能を精密に制御し、細胞の熱感受システムを解明する研究を進めています。




図1. 細胞内温度イメージング(左)
図2. 蛍光性ナノダイヤモンド(FND)と窒素空孔中心(NVC)の模式図(右)






図3.1 細胞分泌実時間イメージングの原理

私たちのからだを構成する細胞の中をのぞいてみると、そこでは、さまざまタンパク質分子が働いています。生き物のことを知るために、タンパク質分子が働くことを調べることがとても大事です。私たちはこれまで、顕微鏡を使って、タンパク質分子が働く様子を直接観察する方法を開発しました。最近はタンパク質が働く場所である細胞を理解するために、細胞の観察も行っています。少しずつですが、生命的不思議に迫っていきたいと思っています。

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
大阪大学 蛋白質研究所
TEL:06-6879-8627
FAX:06-6879-8629



研究室のHPはこちら



17.

生体統御学研究室 微生物病研究所



教授 石谷 太 (Tohru ISHITANI) ishitani@biken.osaka-u.ac.jp
 助教 樋枝 佑紀 (Yuki AKIEDA) akieda@biken.osaka-u.ac.jp
 助教 萩沼 政之 (Masayuki OGINUMA) moginuma@biken.osaka-u.ac.jp
 特任助教 石谷 閑 (Shizuka ISHITANI) shizukai@biken.osaka-u.ac.jp
 特任助教 阿部 耕太 (Kota ABE) kabe@biken.osaka-u.ac.jp
 URL: <https://ishitani-lab.biken.osaka-u.ac.jp/>

私たちのからだは無数の細胞から構成されていますが、これらの細胞はレゴブロックのような“ただの一部品”ではありません。細胞は、隣接細胞あるいは遠隔地の細胞と情報交換を行い、種々の情報を統合処理することで各自に組織内における位置や役割を認識し、これにより適切な機能を発揮します。当研究室では、このような生体を統御し、組織恒常性を支える細胞間コミュニケーションに注目し、個体の発生や再生、老化、および変性疾患の未知のメカニズム解明と、それらを基盤とした新規治療技術の開発を目指しています。


組織恒常性維持の新概念 “モルフォスタシス”

動物組織は、発生段階において多様な搅乱に晒されても、それらを乗り越えて再現よく同じ形を作り上げる能力、“発生ロバストネス”を備えています。また、成体組織も、組織恒常性を維持すべく、古くなった細胞や傷ついた細胞を新たな細胞に入れ替えつつほぼ同じ形を保ち続けますが、一方でその破綻は様々な疾患の発症に関与します。私たちの研究室では、発生ロバストネスと組織恒常性維持機構をまとめて「モルフォスタシス」として捉え、その共通性に注目して研究を行っています。具体的には、細胞イメージングと遺伝子機能解析の双方に適したモデル動物ゼブラフィッシュをモデルに、発生ロバストネスを支える未知の分子システムを見つける、さらにそのシステムの組織恒常性維持における役割、および疾患におけるその破綻を解析して

います。このような研究により、発生生物学と疾患研究を融合させた組織恒常性維持の新概念の探索・確立を目指しています。

個体老化プログラムとその制御

「老化」とは加齢に伴って生理機能が低下する現象ですが、残念ながら、私たち人間を含むほとんど全ての動物はこの現象から逃れることはできず、プログラムされていたかのごとく徐々に老化し、最終的に死に至ります。では、老化はどのようなメカニズムで起こるのでしょうか？これまで線虫などの寿命が短い無脊椎動物モデルを使った研究により、老化プログラムの一端が明らかになりました。しかし、無脊椎動物は体の構造がヒトとは大きく異なり、ヒト老化機構のモデルとしては不十分でした。一方、一般的なモデル動物であるマウスは、寿命が長く（3～4年）、その老化機構を研究するのは困難でした。そこで、私たちの研究室は、ターコイズキリフィッシュという魚に注目しています。この魚は、飼育可能な脊椎動物の中で最も寿命が短く（寿命3～6ヶ月程度）、また、ヒトと類似した老化の表現型（運動能力や繁殖力、認知機能の低下、臓器の萎縮や変性など）を示します。私たちは、この魚をモデルにヒトの個体老化プログラムの解明と、それを基盤とした健康寿命延伸技術の開発を目指しています。



サイエンスを真に楽しめる人材を育てたいです！
仲間たちと一緒に新しい発見を見つけてください！

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-1
大阪大学 微生物病研究所
TEL&FAX: 06-6879-8358



研究室のHPはこちら

18.

蛋白質結晶学研究室 蛋白質研究所



教授 栗栖 源嗣 (Genji KURISU)
 准教授 田中 秀明 (Hideaki TANAKA)
 助教 川本 晃大 (Akihiro KAWAMOTO)

URL: <http://www.protein.osaka-u.ac.jp/crystallography/LabHP/>

Laboratory of Protein Crystallography

我々は、蛋白質結晶学とクライオ電子顕微鏡の手法で蛋白質複合体の立体構造を解析し、立体構造に基づいて生命機能を理解しようという研究室です。精製した蛋白質の構造を解析することで、全ての生命現象を理解できるとは思いませんが、生命が持つ基本的な反応系、例えば「呼吸」、「光合成」、「生体運動」などに限って考えた場合、その働きは複合体蛋白質の立体構造を基に理解することができます。今にも回り出しそうな状態で構造解析されたF1-ATPaseの結晶構造（1998年ノーベル化学賞）などはその良い例でしょう。我々の研究室では「光合成」「エネルギー変換」「生体超分子」をキーワードに、以下のような研究プロジェクトを進めています。

光合成生物のエネルギー変換反応、レドックス代謝ネットワーク

エネルギー変換膜に存在する膜蛋白質複合体やその周辺の蛋白質を結晶化し構造解析することにより、生体膜とリンクした機能発現機構の解明を目指しています。具体的には、光化学系I複合体からフェレドキシンを介して窒素同化酵素へ電子が伝達される仕組み、チトクロムb6f複合体に電子が循環する仕組み、さらには光環境に適応して組み上がる超分子複合体形成の仕組みを複合体状態の結晶構造を基に理解したいと考えています。光環境適応の構造研究は、ロンドン大学クイーン・メアリー（イギリス）、ルール大学ボーフム（ドイツ）、ミュンスター大学（ドイツ）との国際共同研究として行っています。

巨大な生体分子モーターであるダイニンの構造-機能相関の解明

モーター蛋白質は、ヌクレオチド状態に依存する構造変化により運動活性を生み出しています。我々は、微小管系モーター蛋白質であるダイニンの運動機構を完全に理解することを目指して、ダイニンモータードメインの構造解析を行っています。特に、構造の明らかにならない軸糸ダイニンのモータードメイン、その中でも微小管結合領域を含む「ストーク」と呼ばれる長いコイルドコイル領域に注目して構造研究を進めています。また、構造研究の進んでいる細胞質ダイニンについても、ストーク領域が微小管と結合・解離する構造基盤をあきらかにするため、NMRや分子動力学計算も併用して高分解能での構造解析を目指しています。




図1. 光化学系Iと電子伝達蛋白質フェレドキシンの複合体結晶構造（Nature Plants 2018）





図2. ダイニンモータードメインとストーク領域の構造（Nature 2012, J. Mol. Biol., 2014）

この研究室は2024年度に学生を募集しません

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
大阪大学蛋白質研究所
TEL: 06-6879-8604
FAX: 06-6879-8606



研究室のHPはこちら



19.

計算生物学研究室 蛋白質研究所



教授 水口 賢司 (Kenji MIZUGUCHI) kenji@protein.osaka-u.ac.jp
 准教授 橋本 浩介 (Kosuke HASHIMOTO) kosuke.hashimoto@protein.osaka-u.ac.jp
 助教 長尾 知生子 (Chioko NAGAO) c_nagao@protein.osaka-u.ac.jp
 助教 渡邊 恵子 (Reiko WATANABE) reiko-watanabe@protein.osaka-u.ac.jp
 URL: <https://mizuguchilab.org/>

計算科学的手法を用いて、疾患や生命現象の解明と創薬などへの応用を目指した研究を行なっています。様々な分野で人工知能(AI)への期待が高まる中、コンピュータ解析に適した形に整理されたデータをどれだけ利用できるかが、AI開発の成否に大きな影響を与えるとの認識から、遺伝子、タンパク質を中心とする分子レベルのデータから、疾患、化合物などに至る幅広いデータの統合、データベース開発に力を入れています。また、タンパク質の構造、機能、相互作用などを予測する手法の開発と、具体的なデータ解析への応用も推進しています。

分子と高次の生命現象を繋げるためのデータ統合

生命科学の各分野に関連する実験データは、すでに公共データベースに多数格納されています。しかし、それらをビッグデータとして解析、活用するためには多くの課題を克服する必要があります。例えば、実験条件についての情報が十分に構造化されておらず、必要なデータの取捨選択が難しい、用語や単位が統一されていないなどは生命医科学の幅広い研究領域に共通して見られる問題と言えます。我々は、特に分子レベルと高次の生命現象を繋げるための基盤として、各種データベース構築や技術開発を行っています。薬物動態予測モデルの基盤となるデータを整備するため、幾つかの公共データソースから抽出したデータについて、実験条件の精査や単位の正確な変換などのマニュアルキュレーションを施した統合データベースを構築しています。また、創薬初期の探索研究を支援するTargetMineデータウェアハウス(<https://targetmine.mizuguchilab.org>)では、多数のデータベースから遺伝子と疾患・表現型、遺伝子と発現組織などの関係性にわたるデータを取得しており、これらを統合して有効な解析ツールにするために、用語と概念の統一や解析ツールの開発を進めています。

タンパク質を介する相互作用の理解・予測と生体反応のモデル化

Laboratory of Computational Biology

20.

細胞構築学研究室 理学研究科



教授 昆 隆英 (Takahide KON) takahide.kon@bio.sci.osaka-u.ac.jp
 助教 山本 遼介 (Ryosuke YAMAMOTO) ryamamo@bio.sci.osaka-u.ac.jp
 助教 今井 洋 (Hiroshi IMAI) hiroshi.imei@bio.sci.osaka-u.ac.jp
 URL: https://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/bio_web/lab_page/kon/



図1. ハイパフォーマンス計算機システム




図2. 構造情報に基づく医薬品の設計




図3. 初期胚におけるレトロトランスポゾンの発現

多様な国籍、バックグラウンドを持つメンバーが融合できる環境作りを目指しています。

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
 大阪大学蛋白質研究所
 TEL: 06-6105-6961
 FAX: 06-6105-6962

研究室のHPはこちら



私たちの体を構成する細胞は、必要なものを必要な場所に必要なタイミングで供給する効率的な「物質輸送システム」を内包していて、その機能は生命活動に必須です。本研究室では、原子レベルの構造解析と1分子レベルの機能解析の両面からのアプローチにより、この細胞内物質輸送とロジスティクスの分子機構を明らかにすることを目指しています。最近では特に、脳神経系での物質輸送に重要な役割を果たす巨大蛋白質ナノマシン「ダイニン」の運動機構研究に注力していて、その原子構造決定に成功しています。

細胞内輸送システムとは

細胞内では蛋白質をはじめとする多種多様な高分子が毎秒数メートルという猛スピードで熱運動しています。しかし熱運動の方向はランダムであるため、特定の方向への長距離輸送には有効ではありません。例えば、1メートルの長さを持つ神経細胞では、標準サイズの蛋白質分子が細胞体から神経末端に到達するのに、熱運動では100年以上の時間が必要となるのです。真核生物の細胞は、能動的に物質を輸送する蛋白質システムを確立することで、長距離輸送問題にうまく対処しています。この輸送システムは、細胞内物質輸送、細胞分裂、細胞移動など広範な生命活動の基盤となるプロセスを支えていて、部分的にでも欠損すると神経変性疾患、発生異常、不妊など多様な障害を引き起こすことが明らかにされています。本研究室では、この重要な細胞内輸送システムの働くしくみを原子レベルで解明し、化学と物理の言葉で理解することを目指しています。

細胞中心方向輸送エンジン「ダイニン」の運動機構解明

細胞内輸送システムのエンジンに相当するのが、細胞骨格系分子モーターとよば

Laboratory of Molecular & Structural Biology




図1: 細胞中心方向輸送エンジン「ダイニン」の原子構造 (Kon et al., 2012, Nature 484, 345)




図2: 輸送機構異常変異体の軸糸構造 (©2012 Bui et al. Journal of Cell Biology. 198:913-925. doi: 10.1083/jcb.201201120から改変)

研究・人生とは、チャレンジする課題を見つけ、情報を集め、挑戦し、成果を発信することの繰り返しです。そのための基礎を磨き、仲間を集め、そしてともに生物科学の未踏領域に挑戦しよう！

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
 大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
 TEL: 06-6850-5435



研究室のHPはこちら

21.

生体分子反応科学研究室 産業科学研究所



教授 黒田 俊一
 准教授 岡島 俊英
 准教授 和田 洋
 助教 立松 健司
 助教 曽宮 正晴
 URL: <https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/smb/>


Laboratory of Biomolecular Science and Reaction

当研究室は、生体分子間の相互作用（反応）に基づく様々な生命現象を解明し、その作動原理に基づく技術を開発することにより、バイオ関連産業、特に医薬品開発に資することを目標とする。具体的には、ヒト嗅覚受容体群の匂い・香り識別機構、ビルトイイン型補酵素含有酵素の活性部位構造や触媒反応機構、細胞内膜系のダイナミクス機構、細菌2成分情報伝達系の解明にも取り組んでいる。

ヒト嗅覚受容体群の匂い・香り識別機構の解析
 ヒトは約400種類の嗅覚受容体しか発現していないのに、数千万の匂い・香りを識別できる。その識別機構は、ファジーな匂い・香り分子認識能を有する嗅覚受容体群によるパターン認識に基づくと考えられている（嗅覚受容体レパートリーという概念）が、その詳細な認識機構は全く不明である。そこで、当研究室では、全てのヒト嗅覚受容体をヒト由来細胞に発現させ、各嗅覚受容体発現細胞毎にスライドグラス上に整列化させたセルアレイセンサーを開発した。これは、ヒト嗅覚受容体を発現する嗅神経細胞が鼻腔内に存在するヒト嗅上皮を再現したものである。本センサーを用いれば、ヒトが感じる匂い・香り分子を、単純臭だけでなく複合臭でも、全ヒト嗅覚受容体の応答を網羅的かつリアルタイムに同条件で測定できる。この各嗅覚受容体の応答強度を、広範囲な匂い・香りに対して取得解析すれば、世界に先駆けてヒト嗅覚における匂い・香り識別機構（ヒト嗅覚受容体レパートリー）の解明が可能になる。また、特に強調したいのは、本セルアレイセンサーが示す各嗅覚受容体の応答パターン（匂いまトリックスと命名）は、ヒト嗅覚が感じる全ての匂い・香り（単純臭から複合臭まで）を約400次元のパラメータで表現できるものであり、ヒト感の中で唯一遅れていたヒト嗅覚情報のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進するものであり、近未来的のVRやARの基盤技術になるとを考えている。

ビルトイイン型補酵素含有酵素の反応機構と補酵素形成機構

銅アミノ酸化酵素やキノハムプロテイニアミン脱水素酵素などの酵素では、翻訳後修飾によってペプチドに共有結合したビルトイイン型補酵素が形成される。その翻訳後修飾機構と活性型酵素の反応機構を、中性子構造解析を含む構造解析技術ならびに反応速度論的な解析手法を駆使して解明している。前者に分子内架橋を作り出す新規ラジカル酵素の解析に注力している。



細胞内外物質輸送の分子機構と生理的意義
 生命体の秩序の形成には構成要素の時空間的な配置がきわめて大きな役割を持つ。細胞内外の物質と情報の伝達はダイナミックな細胞膜の往来によって担われている。この膜のダイナミクスがどのような分子装置によって実現され、また、どのように多細胞生物の高次生理機能を担うのか、遺伝子変異マウスの表現型を指標として理解することを目指している。

本当に研究が好きで、アカデミック・企業においてバイオ研究者として生きていこうという意志を持っている学生のみを求めています。産学連携活動にも力を注いでおり、幾つかの研究成果を社会実装しています。

〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1
 大阪大学 産業科学研究所
 TEL: 06-6879-8460
 FAX: 06-6879-8464

研究室のHPはこちら



22.

光合成生物学研究室 理学研究科




教授 大岡 宏造 (Hirozo OH-OKA) ohoka@bio.sci.osaka-u.ac.jp

URL: <http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/~ohoka/>

今日も地球上には、太陽から燐々と光がふりそいでいます。約45億年前に誕生した原始地球表面は地中からマグマが吹き出す灼熱世界でしたが、いつの間にか生命が生まれ、多種多様な動植物が活動するオアシスへと生まれ変わりました。その地球上のあらゆる生命活動は、この太陽からの無尽蔵ともいえる光エネルギーによって営まれています。美しい青き地球。光合成は現在の地球環境維持に欠かせない重要な生体反応システムであり、光エネルギーを生物が利用できる化学エネルギーに効率的に変換しています。この光エネルギー変換メカニズムを、分子レベルで理解し、物理と化学の言葉で語ってみようとして研究しています。

光合成反応中心にリンクする電子伝達経路

光合成反応中心が光エネルギーを吸収し、効率よく還元力を作り出すためには、反応中心が効率よくturn overする仕組みが重要です。この経路は高等植物の葉緑体やシアノバクテリアではかなり調べられていますが、私たちが研究対象としている緑色イオウ細菌やヘリオバクテリアではまだよく分かっていません。シクロロムbc複合体との間でサイクリック電子伝達経路が構成されているのではないかと推測しています。これは葉緑体やシアノバクテリアでみられる反応系の祖先型と考えられ、膜を挟んだプロトン駆動力形成の原理を理解する上で重要な経路と考えています。



光エネルギー変換を担う光化学系反応中心

光合成色素の生合成経路

光合成色素であるクロロフィルの生合成経路は非常に複雑で、生物進化の過程でどのようにして出来上がったのかと不思議な思いにかられてしまいます。そこにはさまざまな酵素群（遺伝子群）が関与しているために、生化学者から分子生物学者、さらには有機化学者など、多くの研究者にとって実はとても魅力的な研究領域となっています。私たちはクロロフィルにメチル基を導入する酵素の構造と機能の解析、および直鎖アルコール基（フィトール鎖）の還元課程の解明を進めています。

生物学的水素生産の分子基盤

ヒドロゲナーゼやニトロゲナーゼは、代替エネルギーとして利用価値の高い水素ガスを生産する酵素です。しかしこれら酵素は酸素があるとすぐに失活してしまいます。私たちは酵素が要求する絶対嫌気性条件に着目し、嫌気性光合成微生物を利用した水素生産システムの分子基盤を構築することを目指しています。

光合成は裾野が広い研究分野です。
 いろんなひとが集まる世界。
 自分で解決の糸口を探してみてよう!
 きっと楽しい発見があるはずです。

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
 大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
 TEL: 06-6850-5423
 FAX: 06-6850-6769



研究室のHPはこちら

23.

生物分子機械設計学研究室 情報通信研究機構 未来ICT研究所



招へい准教授 古田 健也 (Ken'ya FURUTA) furutak@nict.go.jp

URL: <http://www.nict.go.jp/frontier/seitai/>

生物分子モーターは、生物の様々な「動き」を生み出す分子マシンです。これらのマシンの一番重要な機能は、熱搖らぎが支配するナノスケールの世界で確実に「一方向に進むこと」ですが、その基本的なメカニズムは未解明です。当研究室では、生物分子モーターであるキネシン・ダイニンを中心に、これらが一方向性運動を生み出すメカニズム、力・運動方向の決定機構、エネルギー変換機構に興味を持って研究しています。また、これらの集合体の特性や細胞内環境での特性にも興味を持っています。発展的な研究として、天然から得られる分子マシンを参考に設計し直した新しい分子マシンや、これらを組み合わせて計算機能やメモリーを実装し、自律的な微小ロボットを設計・創出する研究も進めています。

分子モーターそのものの設計原理

生物分子モーターが働いている熱搖らぎが支配する環境で、アミノ酸がつながったヒモが折りたたまれただけのタンパク質が、確実に一方向に進むことは一見難しそうに思えます。これを理解するために、私たちは既存の生物分子モーターの分析に加え、いくつかの単純な要素を組み合わせて新しい生物分子モーターを試作し、それがどう振る舞うかを観察することによって「創って理解する」という構成的な研究手法を確立しようとしています(図1)。

分子モーターの集団特性・制御方法の設計

個々の分子モーターはそれぞれがバラバラに機能していては生命現象を起こすことができません。分子、小器官、細胞、個体と階層を上がるに従い、バラバラだった動き

Laboratory of biomolecular machine design




図1. タンパク質エンジニアリングで逆方向性の分子モーターを創る(Furuta et al., *Nat Nanotech* 2017)。



図2. Y字型のDNAナノチューブ上で二種類のナノマシンが「荷物」を仕分けている様子を描いた模式図(Ibusuki et al., *Science* 2022)。



図3. 当研究室が目指す自己組織化による階層的な構造を持つ自律型微小ロボットの例(Furuta et al., *Curr Opin Biotechnol* 2017)。

〒651-2492 神戸市西区岩岡町岩岡588-2
国立研究開発法人 情報通信研究機構
未来ICT研究所
TEL:078-969-2214
FAX:072-969-2239

研究室のHPはこちら



24.

超分子構造解析学研究室 蛋白質研究所

Laboratory of Supramolecular Crystallography



教 授 中川 敦史 (Atsushi NAKAGAWA)
准教授 鈴木 守 (Mamoru SUZUKI)
准教授 山下 栄樹 (Eiki YAMASHITA)

atsushi@protein.osaka-u.ac.jp
mamoru.suzuki@protein.osaka-u.ac.jp
eiki@protein.osaka-u.ac.jp

URL: <http://www.protein.osaka-u.ac.jp/rcsfp/supracryst/>

生物学的に重要なタンパク質や、複数のタンパク質／核酸コンポーネントが会合することによって働いている生体超分子複合体の機能を原子レベルでの構造から明らかにする研究を進めています。この目的のために、SPring-8の生体超分子構造解析ビームライン(BL44XU)を利用した構造解析法など、X線結晶構造解析に関する新しい方法論の開発も行っています。

生体超分子複合体の構造解析法の開発

生体超分子複合体の結晶は、通常の蛋白質結晶に比べて、格子定数が大きく、また、回折強度が非常に弱いことが知られています。さらに、X線照射に対してダメージを受けやすいものが多いのも特徴です。このような生体超分子複合体の回折強度データを、高分解能かつ高精度に測定することを目的として、大型放射光施設SPring-8に専用ビームラインを設置し、管理・運営を行うとともに、放射光を利用した高精度データ収集法や新しい構造解析法の開発などの技術開発を行っています。また、構造解析全自動パイプラインなどの開発も行っています。

生体超分子複合体の構造解析

数多くのタンパク質が会合して機能を発揮する生体超分子複合体を通して、生命機能の理解に重要な分子間相互作用と分子認識機構の解明を目指し、X線結晶構造解析とクライオ電子顕微鏡による単粒子解析を利用した研究を



図1:SPring-8の生体超分子構造解析ビームライン




図2:緑膿菌由来異物排出蛋白質複合体 MexAB-OprMの構造(Tsutsumi et al., *Nat. Commun.*, 2019)



専門にとらわれず、広い視野を身に付けることを
心がけてください。

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
大阪大学 蛋白質研究所
TEL:06-6105-8635
FAX:06-6105-4313

研究室のHPはこちら

25.

電子線構造生物学研究室 蛋白質研究所



教 授 加藤 貴之 (Takayuki KATO)
助 教 岸川 淳一 (Jun-ichi KISHIKAWA)
助 教 高崎 寛子 (Hiroko TAKASAKI)

URL: <http://www.protein.osaka-u.ac.jp/cryoem/>

蛋白質は20種類のアミノ酸がペプチド結合で結合した1本の長い生体高分子です。そのアミノ酸配列というプログラムに従って、自発的に決まった立体構造を取り、センサーであったり、モーターであったり、おおよそ人間が考えうるあらゆる機能を持つ機械として働きます。それならナノサイズの分子機械がどのように立体構造を取っており、どのようなメカニズムで機能を発揮するかを明らかにするために、クライオ電子顕微鏡（クライオ電顕）を使った構造解析を行っています。

分子モーターの作動メカニズムの解析
蛋白質は生体中で柔軟に構造変化を繰り返してその機能を発揮しています。回転する分子モーターであるべん毛モーターや、ATPaseなどはその代表で、運動をする過程で、非常に大きな構造変化を伴い、少ないエネルギーで効率的に運動することができます。このメカニズムを明らかにするためには、それら分子モーターが動作している最中の構造変化をとらえる必要があります。クライオ電顕では、いろいろな構造状態の画像を撮影し、それをつなぐことで運動している様子を可視化することができます。そのようにして機能状態の構造解析からメカニズムを明らかにします。

嗅覚受容体の構造解析

人は約400種類ほどある嗅覚受容体によって何万という匂いをかぎ分けることができます。この嗅覚受容体はG蛋白質共役受容体(GPCR)ファミリーに属する7回膜貫通型蛋白質です。揮発性である匂い分子がこの嗅覚受容体に結合し

Laboratory of CryoEM Structural Biology




図1 べん毛フックの構造
べん毛は曲がった状態が機能状態であり、この形のまま構造解析ができる手法はクライオ電顕しかない




図2 蛋白研所有のクライオ電子顕微鏡
蛋白研には世界最高レベルのクライオ電子顕微鏡とスクリーニング用の電子顕微鏡が1台あり、蛋白質の構造解析をスムーズに行う環境が整っている

学ぶ楽しさ、発見する喜びが実感できるのは学生の特権です。大いに学び大いに遊んでください。

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
大阪大学 蛋白質研究所
TEL&FAX:06-6105-6079

研究室のHPはこちら



26.

機能構造計測学研究室 蛋白質研究所




准教授 松木 陽 (Yoh MATSUKI)
准教授兼任 宮ノ入 洋平 (Yohei MIYANOIRI)

URL: <http://www.protein.osaka-u.ac.jp/biophys/bussei.html>

私たちの体の中ではさまざまなエネルギー変換や情報変換が生体膜を介して行われている。これら機能を担っている超分子システムは生命活動のネットワークを作る上で重要な役割を果たしている。現在、これらの働きを持つ分子の構造が次々に明らかになっている。私たちは、主に核磁気共鳴法(NMR)を用いて、情報変換やエネルギー変換をつかさどる蛋白質の動きを、立体構造に基づいて明らかにすることをめざして研究している。

固体NMR法による蛋白質の構造、機能解析

固体NMRでは、X線回折など他の方法による解析がむずかしいが、生体での情報の変換において重要な分子複合系の構造と機能の研究に取り組んでいる。具体的には、脂質二重膜に強く結合している蛋白質や非結晶状態の大きな分子複合体などで、これには、光情報伝達する膜蛋白質pHtrII、G蛋白質とそのレセプターの複合体、アミロイド蛋白質などが含まれる。さらに、細胞内の位置特異的な蛋白質の構造解析、相互作用解析にも取り組んでいる。また、生物学と同様にNMR実験法や解析法も大きく進んでいる。固体NMR法の特徴を利用して対象からより詳しい情報を搾り取るために、実験法やデータ解析法も開発しながら研究を進めている。



有用な手段である。本研究室では、おもに蛋白質の立体構造をNMRによって解析している。さらに、立体構造が既知のでもその蛋白質が他の蛋白質あるいはリガンドとどのように相互作用して機能が制御されているか高い構造分解能で解析している。さらに、比較的遅い運動であるマイクロ秒、ミリ秒程度のダイナミクスを解析することによって、活性との相関を議論している。これらの解析に必要な方法論はまだ発展途上にあるため、その方法論の開発も同時にしている。

研究テーマ

1. 細胞内での蛋白質機能と構造の原子分解能解析
2. アミロイド蛋白質の構造機能解析
3. 生体膜を介しての情報変換に関する蛋白質の構造と機能解析
4. 選択的安定同位体標識法に基づくNMR蛋白質構造解析法の開発
5. 常磁性プローブ分子を利用した蛋白質の構造や構造変化の解析
6. バイオインフォマティクスを利用したNMR立体構造解析法の開発
7. テラヘルツ波を利用した超高感度NMR法の開発と生体系への応用




図1 蛋白質間相互作用を示す2次元NMRスペクトルと明らかになった蛋白質コピキチンとYUHの相互作用



図2 超高感度DNP-NMR装置。極低温でNMRを観測する超伝導マグネット(左)とテラヘルツ波光源であるジャイロトロン(右)

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
大阪大学 蛋白質研究所
TEL:06-6879-8598
FAX:06-6879-8599



研究室のHPはこちら

27.

生物分子情報研究室

理化学研究所 生命機能科学研究中心



招へい准教授 Li-Kun PHNG

URL: <http://phnglab.riken.jp/index.html>

Laboratory of Biomolecular Informatics

The establishment and maintenance of a network of blood vessels is crucial throughout the lifetime of a vertebrate. During development, blood vessels supply oxygen and nutrients to meet the demands of growing tissues such that inadequate blood vessel formation can lead to embryonic lethality. In the adult, the circulatory network of blood vessels caters for the metabolic needs of tissues and organs; serve as conduits through which immune cells travel to sites of infection; and, importantly, new blood vessel formation is necessary for tissue repair. The formation of new blood vessels frequently occurs through sprouting angiogenesis, where new vessels are generated from pre-existing ones. Sprouting angiogenesis is a multicellular process that is tightly regulated in time and space beginning with the formation of new vascular sprouts composed of endothelial cells. Together, endothelial tip and stalk cells migrate in a collective manner to invade hypoxic tissues. The polarised migration of endothelial cell collectives requires the coordinated behaviour of individual endothelial cells that is mediated through cell-cell junctions, which act as sites of mechanocoupling to transmit force from one cell to another. Endothelial cells also undergo extensive changes in cell shape that is adapted to function. Live imaging has revealed that local and transient cell shape changes underlie migration, cell rearrangements, anastomosis and lumen formation, which are cellular behaviours that are critical for building a multicellular tubular vascular network.

Once blood vessels become lumened, endothelial cells are exposed to haemodynamic forces such as fluid shear stress and blood pressure. Previous work demonstrates that blood pressure locally deforms the apical membrane of endothelial cells to generate inverse blebs during lumen formation (Gebala et al., 2016). In turn, endothelial cells counteract the deforming forces by triggering an actomyosin-dependent repair mechanism to retract the blebs. More recently, we discovered that endothelial cells adapt to increasing haemodynamic forces by generating a cortex composed of a balanced network of linear and branched actin bundles that resist fluid forces (Kondrychyn et al., 2020). When the balance of linear and branched actin bundles is skewed towards linear by the over expression of the actin bundling protein, Marcks1l, the endothelial cell cortex becomes weaker and more deformable, leading to ectopic membrane blebbing and cell enlargement when subjected to haemodynamic forces. This work therefore highlights the importance of cortical actin organization in modulating endothelial cell mechanoresponse to blood flow to regulate cell and vessel shape. Future work in the lab is aimed at quantifying the types and magnitude of haemodynamic forces (wall shear stress, luminal pressure) that endothelial cells are exposed to during vessel morphogenesis using computational fluid dynamics modelling, and how endothelial cells sense and respond to changes in haemodynamic forces.

My lab is interested in understanding the morphogenetic processes of blood vessel formation and maintenance. Using the zebrafish as a model system, we employ genetics, molecular biology, optical and pharmacological approaches with high resolution time-lapse imaging to investigate how endothelial cell behaviours are regulated and coordinated to build vessels of specific size and architecture.

Endothelial cell shape regulation

Endothelial cells undergo extensive cell shape changes required to drive specific cellular processes. In our lab, we seek to understand how the actin cytoskeleton regulates endothelial cell shape plasticity. We have previously shown that during sprouting angiogenesis, the generation of actin bundles in filopodia facilitates efficient cell migration and anastomosis (Phng et al., 2013). During lumen formation, transient polymerization of actin at the apical membranes controls lumen expansion (Gebala et al., 2016) while actin cables at endothelial cell-cell junctions stabilize newly-formed

tubules to produce a functional vascular network (Phng et al., 2015). Our work therefore demonstrates that actin cytoskeleton of different dynamics and localization drive distinct steps of vessel morphogenesis. Future studies in the lab include understanding how the actomyosin cytoskeleton is remodelled and organized to generate specialised subcellular structures that drive cell shape changes during angiogenesis, and, upon the establishment of a patent vascular network, how endothelial cells maintain their shape and the vessel retain its structure.



Figure 1: Blood vascular network in a developing zebrafish embryo



Figure 2: Actin cytoskeleton in a zebrafish intersegmental vessel.

Seeing is believing.

〒650-0047

兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3C棟N202
理化学研究所 生命機能科学研究中心

TEL:078-306-3195
FAX:078-306-3196



研究室のHPはこちら

28.

生体非平衡物理学研究室

理化学研究所 生命機能科学研究中心

Laboratory of Nonequilibrium Physics of Living Matter



招へい准教授 川口 喬吾 (Kyogo KAWAGUCHI)

kyogo.kawaguchi@riken.jp

URL: <https://www.bdr.riken.jp/ja/research/labs/kawaguchi-k/>

Data acquisition, analysis, and extracting hidden rules

Our goal is to create a theoretical framework that encompasses biological phenomena, and we believe that the shortest way to achieve this is to collect high-quality data. In our laboratory, we mainly use long-time-lapse imaging and genetic manipulation techniques to observe in detail the behavior of collective cell behavior and intracellular condensates, as well as cell differentiation. Based on the large amount of data obtained, we develop methods to extract the rules behind the phenomena and implement them using tools such as image analysis and machine learning.




図1: ターンオーバーする皮膚組織中の幹細胞




図2: トポロジカル欠陥に集まる神経幹細胞

•
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3
理化学研究所 生命機能科学研究中心

TEL:078-306-3354
FAX: 078-306-3354



研究室のHPはこちら

29.

機能・発現プロテオミクス研究室

蛋白質研究所



教授 高尾 敏文 (Toshifumi TAKAO)

助教 櫻井 航輝 (Koki SAKURAI)

URL: <http://www.protein.osaka-u.ac.jp/rcsfp/profiling/>


高感度、短時間で分析が可能な質量分析法は、様々な生体内微量蛋白質のアミノ酸配列や翻訳後修飾の解析に利用されている。最近では、蛋白質や遺伝子データベースの充実とともに、生体内の総発現蛋白質を網羅的に解析することで様々な生理的現象を解明しようというプロテオミクス研究の基盤技術となっている。当研究室では、質量分析によるペプチド・蛋白質の一次構造解析のための化学・分析的手法や装置の開発、そして質量スペクトルを確度よく解析するためのソフトウェアの開発、整備を行うとともに、それらを用いて生理的に重要な微量蛋白質の同定や翻訳後修飾の構造解析を行っている。

質量分析による蛋白質一次構造解析のための化学的手法、及び、解析ソフトウェアの開発

蛋白質の一次構造や発現(存在)量を質量分析により微量で解析するために、1) 安定同位体¹⁸Oを利用したアミノ酸配列解析法、及び、量変動解析、定量法の開発、2) 気相化学反応装置による多検体同時エドマン分解法の開発、3) 質量スペクトルをもとにペプチドのアミノ酸配列を解析できるソフトウェア(SeqMS)、蛋白質同定支援ソフトウェア(MS-Match)、そして、複雑な同位体パターンの解析が可能なソフトウェア(Isotopica)をキューバ国立遺伝子生物学研究センターとの共同で開発した。現在、これらのソフトウェアは <http://www.protein.osaka-u.ac.jp/rcsfp/profiling> から利用することができる。

質量分析による蛋白質翻訳後修飾の構造解析


蛋白質の生理機能と密接に関わっている種々の修飾基(糖鎖、リン酸化、脂質等)



の構造解析法に関する研究、及び、新規蛋白質翻訳後修飾の構造解析を行っている。最近では、蛋白質や遺伝子データベースの充実とともに、生体内の総発現蛋白質を網羅的に解析することで様々な生理的現象を解明しようというプロテオミクス研究の基盤技術となっている。当研究室では、質量分析によるペプチド・蛋白質の一次構造解析のための化学・分析的手法や装置の開発、そして質量スペクトルを確度よく解析するためのソフトウェアの開発、整備を行うとともに、それらを用いて生理的に重要な微量蛋白質の同定や翻訳後修飾の構造解析を行っている。

生体試料のプロテオミクスとバイオマーカー探索法の開発

様々な生理現象や病態に直接関連するペプチドや蛋白質(バイオマーカーや疾患マーカー分子)の探索研究を行っている。現在、尿等の体液から蛋白質を効率よく単離するための前処理法や新規N末端ブロックペプチド単離法の開発を行って、生理的に異なる試料中に含まれるペプチドや蛋白質を網羅的に同定し、データベース構築を行っている。また、多検体間の比較解析を効率よく行うためのソフトウェア開発も行っている。




質量分析におけるペプチド、糖鎖、脂質のフラグメンテーションに関する研究

ペプチドや糖鎖、脂質の質量分析において観測される特徴的なフラグメンテーションと構造解析への応用に関する研究を行っている。例えば、メチルリシン、トリメチルリシン、アセチルリシン、リン酸化セリン/スレオニン、酸化メチオニン等を含むペプチドのMS、あるいは、MS/MSでは、修飾基特異的なフラグメンテーションが観測され、それら修飾アミノ酸の同定に有効である。

この研究室は2024年度に学生を募集しません

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
大阪大学 蛋白質研究所
TEL:06-6879-4312
FAX:06-6879-4332

研究室のHPはこちら



30.

蛋白質有機化学研究室

蛋白質研究所



教授 北條 裕信 (Hironobu HOJO)

助教 武居 俊樹 (Toshiaki TAKEI)


助教 伊藤 駿 (Shun ITO)

URL: <http://www.protein.osaka-u.ac.jp/organic/>

Laboratory of Protein Organic Chemistry

膜蛋白質の合成法の開発及びその膜蛋白質機能解明への応用

膜貫通部分を有する蛋白質は、ホルモン受容体やイオンチャネル等高次の生命現象に関与しています。従って、これらは生命現象を理解する鍵となる物質であるとともに、薬物開発の観点からも興味深い研究対象であるといえます。当研究室では上記の方法をさらに発展させ、効率的な膜蛋白質の合成法の完成を目指して研究を進めています。膜蛋白質合成における大きな問題点は、それらが脂質二重膜に埋まっているため高度に疎水性になっていることです。このため、化学合成途上の種々の場面でポリペプチド鎖が難溶性となり、反応が進行しない、精製ができない等の問題点が生じます。そこで既存のポリペプチド鎖の可溶化を促す方法、新規の方法を開発することによりペプチドの溶解性を向上させ、膜蛋白質の全合成を達成しようと考えています。(図3)



分子レベルの工作です。もの作りが好きな人は、とってもはまります。

私たちの研究室では、有機合成法を利用して化学的に蛋白質をつくり、その機能を調べる研究をしています。生物に依存しない化学法では、例えば天然にないアミノ酸、また何らかのマーカーとなる化合物を蛋白質中の任意の場所に自在に導入することができます。このため、蛋白質の体の中での機能を詳細に調べたり、新しい機能を持つ蛋白質を作り出すといった化学合成の特徴を生かした蛋白質研究が実現できるのではないかと考えています。現在行っている具体的な研究内容は以下の通りです。

効率的な蛋白質合成法の開発

1991年にペプチドチオエステルを用いる蛋白質合成法を開発して以降、蛋白質合成におけるペプチドチオエ斯特の重要性が飛躍的に高まっています。このため、ペプチドチオエ斯特を効率的に、また温和な条件で合成する方法の開発が世界中で進められています。我々のグループでも転位反応を用いてペプチドチオエ斯特を得る独自な方法を見出し、さらなる効率化にて研究を行っています。また、ペプチドチオエ斯特をいかに効率よくつなげて蛋白質へと導くかという縮合法の開発も進めています(図1)。これらの手法を用いて下記のような蛋白質の合成研究、機能解析を行っています。




図1.チオエ斯特を用いた蛋白質合成法




図2.糖蛋白質の合成例

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3-2
大阪大学 蛋白質研究所
TEL:06-6879-8601
FAX:06-6879-8603



研究室のHPはこちら

31.

学際グループ研究室 理学研究科



准教授 久保田 弓子 (Yumiko KUBOTA)

Laboratory of Interdisciplinary Biology

URL: <https://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/~ykubota/>

ykubota@bio.sci.osaka-u.ac.jp


面白い研究をしよう

(核機能学分野) 「殖える」ことは生物を特徴づける特性です。生物の基本単位が細胞であることを考えると、細胞が「殖える」ことが、生物の基礎にあるともいえます。1個の細胞が2個に増える時、細胞の設計図が載っているDNAは、どの部分も欠けること無く、どの部分も重なること無く、正確に複製された後に、2つの娘細胞に分配されなければなりません。この正確なDNA複製の仕組みを知るために、アフリカツメガエル卵抽出液をもちいたin vitro系で、染色体複製機構を調べています。

賣核細胞におけるDNA複製開始の制御機構と複製チェックポイント

DNAの複製に関わるタンパク質はここ数年の研究でかなり解明され、ある複製開始

点からどのようにDNA複製が始まるかの基本的な経路は、特に酵母などの単細胞生物ではかなりわかっていました。しかし、ヒトを含む多細胞生物ではまだ完全には明らかになっていない点があります。また、長いDNA鎖を限られた数のタンパク質で、限られた時間内に完全に複製するには、それぞれの複製開始点がどのように空間的に分布し、時間的に調整されているかも理解しないかもしれません。DNAに障害が生じた時などに複製の抑制に働くための複製チェックポイント機構は、複製開始タンパク質も標的にしており、これが通常の複製開始の制御にも働いています。我々は、複製開始の基本経路を調べると共に、ひとつの複製開始点が他の場所からの複製開始をど



アフリカツメガエル卵抽出液を用いて精子染色体から形成された核。青:DNA 赤:蛍光ラベルしたヌクレオチドによるDNAの複製

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
TEL:06-6850-5554



研究室のHPはこちら

人に感動を与える
サイエンスを行いましょう



准教授 中川 拓郎 (Takuro NAKAGAWA)

nakagawa.takuro.sci@osaka-u.ac.jp


URL: <http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/~takuro/science/>

(分子遺伝学分野) 生物の遺伝情報は、DNA上に塩基配列として書き込まれています。細胞核の中では、DNAはヒストンと結合してヌクロソームを形成し、それらが集合して染色体となります。染色体の数や大きさは、種によって一定に保たれています。しかし、転座などの染色体異常が起こると、細胞死や癌などの遺伝病が引き起こされます。しかし、どのようにして、染色体が維持されるのか? 染色体異常が起きるのか? については未だ解明されていません。

染色体維持と染色体異常の分子機構
真核生物のゲノムには、興味深いことに、トランスポゾンなどの反復配列が非常に多く存在します。こうした反復配列を「のりしろ」に転座などの染色体異常が起こります。我々は分裂酵母を用いて、染色体維持、あるいは、染色体異常に関与する因子を同定し、その機能を研究しています。

セントロメア領域で起きる染色体異常

セントロメアは動原体を形成する染色体領域であり、多くの生物種では、反復配列が多数存在します。セントロメアで起きるロバートソン転座は、ヒトで最も高頻度に観察される染色体異常です。



分裂酵母(赤)の核(青)とセントロメア(黄)

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
TEL:06-6850-5432



研究室のHPはこちら

学際グループ研究室 理学研究科



准教授 今井 薫 (Kaoru IMAI)

Laboratory of Interdisciplinary Biology

生き物の発生は
不思議がいっぱいです。

imai@bio.sci.osaka-u.ac.jp



かつ全ての組織タイプについて明らかにできるという可能性を示しています。単純ではあるものの、脊椎動物の原型をなす動物を用い、そのほとんどの組織について細胞運命決定機構を解明することは、発生学の進歩において有意義な一里塚になるとを考えられます。

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
TEL:06-6850-6760

(発生生物学分野) 我々はすべて100ミクロンの受精卵から発生してきた。いったいどのようなしくみで、そんなことが可能になるのかを考えてみたことがあるだろうか。私たちの研究室では、分子生物学的手法を駆使し、いかにして卵からからだができあがるかという問題に取り組んでいます。

ホヤ初期胚発生の細胞・分子レベルでの解析

発生過程では、ただ細胞の数が増えるだけではなく、多種多様な機能を持った細胞が作り出されます。例えば、表皮、筋肉、神経、血細胞などがそれです。これらの細胞もすべて元をたどれば、受精卵からできてくるわけです。卵が分裂した後、特定の細胞が筋肉に、また別の細胞

が神経になっていくのは、どのような仕組みによっているのでしょうか。すなわち細胞の発生運命決定のメカニズムを解明するのが、本研究室のテーマです。

実験材料としては、脊椎動物に進化する少し手前の動物であるホヤを用いています。ホヤの受精卵は、18時間で右のようなオタマジャクシに発生します。すでにホヤの発生は詳細に記載されており、胚のどこから、オタマジャクシのどこがつくり出されるかを、正確に予測できるのです。


研究の独創的な点は、発生運命の決定機構に関して、ホヤという実験動物を取り上げ、それをまるごと一匹分、解明しようとすることにあります。ホヤのオタマジャクシ幼生は単純な構造を持ち、少数の細胞でできています。このことは、胚発生における発生運命の決定機構を組織ごとに、



助教 浅田 哲弘 (Tetsuhiro ASADA)

tasada@bio.sci.osaka-u.ac.jp

問い合わせの出会いを大切に



対称性の高い形をもつプロトプラスト由来単離タバコ細胞では等分割傾向(左)と長軸に対して垂直の面で分割する傾向(右)が顕著である

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
TEL:06-6850-6776



植物の組織形成は、新しい仕切り壁の面、すなわち細胞分裂面の調節に大きく依存している。その調節とはどうやって可能になっているのか?

形成途上にある組織は、これから分裂する細胞が適切な分裂面を選択するのを助ける情報をもっているはずである。それが何で、細胞はその情報をどう扱うのかを知るには、逆説的だが、組織情報の無い系における分裂面選択、すなわちデフォルト選択の傾向を把握する必要がある。筆者は最近そのことを指摘し、単離タバコ細胞を用いた検討を行った(参考として右図)。

地上一次生産を支える発生ロジックに関する心のある者が集う部屋にできたらと思う。

研究室のHPはこちら

32.



生命機能グループ研究室 生命機能研究科



准教授 富永 恵子 (Keiko TOMINAGA) tomyk@fbs.osaka-u.ac.jp

URL: <https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/d5bbff3350025e27.html>

概日時計(体内時計)は、地球の自転とともに1日周期の環境変動に生物が適応するために獲得した重要なシステムです。哺乳類では、視床下部視交叉上核(SCN)に存在する体内時計が自律振動を生み出す中枢時計として働いています。中枢時計は体内環境を体外環境に調和させるために、生み出した自律振動と環境の周期的変動との位相のずれを調節し、その情報を身体中の末梢時計へと送ります(下図)。その結果、睡眠・覚醒、体温、ホルモン分泌などの様々な生理現象が、適した時刻にピークをもつリズムとして現れてくるのです。体内時計を調節する環境因子として最も強力なものは光ですが、光以外の環境因子、たとえば、食事のタイミングや社会的な相互作用なども体内時計を動かすことがわかっています。私たちは、さまざまな環境因子が体内時計にどのような影響を及ぼすのかを分子レベルで明らかにすることを目指しています。さらに、環境因子の履歴効果、すなわち、体内時計の可塑性についても研究しています。



神経伝達、ホルモン分泌を介した末梢時計の調節





図: 12時間12時間の明暗条件下(LD)に置いた時と恒常暗条件下(DD)に置いた時のマウス行動リズム。DDでは行動リズムがフリーランする。



哺乳類の体内時計

哺乳類の体内時計は、脳の奥底の視床下部視交叉上核(SCN)に存在します。SCNは片側断面が直径300 μmほどの小さな神経核ですが、ここを破壊すると身体のあらゆるサーカディアンリズム(概日リズム)が消失します。また、SCNを体外に取り出して培養下に移しても、細胞が生きているかぎり、自律的に約24時間の周期で振動し続けます。時計遺伝子の発見以来、体内時計の自律振動の中心的仕組みが明らかになりました。SCNには時計遺伝子群が明瞭なリズムをもって発現しています。これら時計遺伝子群の転写・翻訳、そしてその蛋白質による自身の転写制御というフィードバックループが体内時計のコアとなるメカニズムです。

体内時計に影響を及ぼす様々な因子

外界のさまざまな環境因子が、体内時計の位相や周期を変化させます。その中でも特に光は、体内時計を動かす強い環境因子ですが、その作用は体内時計の位相(時刻)によって異なります。私たちは、ある特定の時刻にのみ光が体内時計を動かすという、環境因子作用の位相依存性について調べています。また、マウスを特殊な環境下に置くと、概日リズムが変化し、履歴効果として長期間持続します。このような、概日リズムの可塑性現象にも興味をもち、体内時計のどのような機構が関与しているかについて研究を進めています。この研究は、私たちの心身の不調と体内時計の不調の密接な関係の解明につながると期待されます。さらに、体内時計の位相や周期に作用する、光以外の因子の探索も行っています。

昼行性動物と夜行性動物の体内時計

実験マウス(C57BL/6やBALB/cなど)のように夜間活動する夜行性動物と、ヒトのような昼間覚醒している昼行性動物のSCNの神経活動は、いずれも、昼が高く、夜は低いという概日リズムを示します。しかし、SCNに存在する体内時計の性質が、昼行性と夜行性で全く同じものなのか否かは、まだ明確にはわかっていないません。そこで、ヒトの体内時計の理解につなげるために、昼行性動物の体内時計の性質を調べています。

哺乳類の概日時計の謎を解明しよう

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-3

大阪大学大学院 生命機能研究科

TEL: 06-6879-4662

FAX: 06-6879-4661



研究室のHPはこちら

33.

生物無機化学研究室 理学研究科




教 授 船橋 靖博 (Yasuhiro FUNAHASHI)
講 師 野尻 正樹 (Masaki NOJIRI)
助 教 畑中 翼 (Tsubasa HATANAKA)

URL: <http://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/lab/funahashi/>

Laboratory of Bioinorganic Chemistry

funahashi@chem.sci.osaka-u.ac.jp
nojiri@chem.sci.osaka-u.ac.jp
hatanakat13@chem.sci.osaka-u.ac.jp



光励起と電子伝達

光合成や呼吸において生命活動に必要なエネルギーの移動は、まず電子をキャリアとして行われます。例えば酸素発生型の光合成の明反応において、光励起電子は蛋白質中を移動してNADPHを生じます。一方、正孔はマンガンクラスターに伝達され水の酸化によって消滅して酸素発生します。このいずれのプロセスもプロトン濃度勾配に寄与してATP合成も促します。このZスキームで中間の電子移動を担うのは酸化還元活性なヘム鉄や鉄硫黄クラスター、タイプI銅などの遷移金属を含んだ一連の電子移動蛋白質です。これらの電子やプロトンの移動過程は、蛋白質構造のダイナミクスだけでなくトンネリングの様な量子効果にも依存し、我々の研究課題になっています。

蛋白質の研究を行うことは、生命の起源やその後の分子進化の理解にも繋がります。一方、天然の金属蛋白質の活性部位と人工的に合成した金属錯体は化学的性質に共通点が見られ、光エネルギー利用に必要な光増能を獲得するものもあります。金属蛋白質と関連した金属を含む機能性錯体や人工金属酵素の新規開発にも取り組んでいます。

抗がん活性のある金属錯体の合成
細胞内情報伝達機構を阻害することによって転移するガン細胞がアポトーシスを起こす金属錯体を、抗がん剤として開発しています。

チャレンジ精神が旺盛で元気な人を歓迎します。

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山1-1
大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
TEL: 06-6850-5767



研究室のHPはこちら

人工金属酵素の開発

以上のような観点で金属蛋白質の研究を行うことにより、金属蛋白質の機能と構造の相関の解明することをまず目的のひとつとしています。生命はその発生当初からすでに必須元素として金属を積極的に取り込んでおり、このように天然の金属

34.

高分子構造科学研究室 理学研究科



教授 今田 勝巳 (Katsumi IMADA)
 准教授 金子 文俊 (Fumitoshi KAMEKO)
 講師 川口 長也 (Tatsuya KAWAGUCHI)
 助教 竹川 宣宏 (Nobuhiro TAKEKAWA)
 URL: <http://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/lab/imada/>

生体内では、生体高分子が多数集合してできた分子機械が様々な化学反応や機能を担い、生命活動を支えています。生体高分子でできた分子機械は人工システムとは異なり、高精度といい加減さが両立しながら機能します。細菌のべん毛システムや蛋白質輸送システムは代表的な生体分子機械です。このような生体分子機械の作動機構や形成機構を、原子レベルの立体構造解析と分子機械の再構成を通して探ります。

回転分子モーターの形成機構と回転機構の解明


細菌の運動器官であるべん毛は、生物の中で初めて見つかった回転機構を持つ構造体です。べん毛の根元には、蛋白質分子が多数集合してできた直径約40nmのモーターがあります。細胞膜内外の水素イオンやナトリウムイオンの濃度差をエネルギー源として作動し、水素イオンモーターは毎秒300回、ナトリウムイオンモーターは毎秒1500回の猛烈な速さで回転します。このモーターは逆回転も可能で、走化性センサーからの信号で反転することで、細菌は進行方向を変えます。固定子である膜蛋白質複合体中をイオンが通過する際に、固定子と回転子が相互作用することでトルクが発生すると考えられていますが、回転の分子機構は不明です。また、固定子はモーターが回転中に頻繁に入れ替わり、モーターに組込まれるとイオン透過が始まっています。しかし組込み・離脱、それに共役するイオン透過のON/OFFの分子機構は全く分かっていません。これらの謎を解くため、走化性センサー・回転子・固定子を構成する蛋白質、その複合体の構造・機能解析に取り組んでいます。

細菌の蛋白質輸送システムの構造と機能の解明

細菌べん毛は菌体外部に構築されるので、細胞内で合成したべん毛蛋白質を細胞外へ輸送しなければなりません。そのため、べん毛蛋白質のみを選択し、適切なタイミングで細胞外へ送り出すための輸送装置がべん毛根元にあります。単に輸送するだけでなく、べん毛の形成状況に応じて輸送する蛋白質を切り替えたり、輸送する蛋白質の発現制御も行います。この輸送装置は病原性細菌が感染する際、宿主細胞へ病原因子蛋白質を直接送り込むために使われるIII型輸送装置の仲間であり、同様の機構で作動すると考えられています。輸送の分子機構は不明ですが、最近、輸送装置蛋白質が回転分子機構を持つFoF1-ATP合成酵素と同様な構造を持つことが明らかになり、新たな展開が始まっています。

歯周病菌の線毛の構造と機能の解明

歯周病の主要な病原菌であるジンジパリス菌は、バイオフィルム形成や宿主細胞への付着するために、少なくとも2種類の5型線毛を持ちます。線毛形成と宿主への付着のしくみを解明するために構造解析と線毛の再構成を行っています。



〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
 大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
 TEL&FAX: 06-6850-5455

生体分子機械のしくみもそぞうですが、分かっているようで実分からないことが世の中にはたくさんあります。
 分かっていないことが何かを、じっくり考えて下さい。新しい世界が開けてきます。

研究室のHPはこちら



35.

超分子機能化学研究室 理学研究科




教授 山口 浩靖 (Hiroyasu YAMAGUCHI) hiroyasu@chem.sci.osaka-u.ac.jp
 助教 小林 裕一郎 (Yuichiro KOBAYASHI) kobayashi11@chem.sci.osaka-u.ac.jp
 URL: <http://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/lab/yamaguchi/>

生体系では様々な（分子内・分子間）相互作用を介して、高度かつ特異な機能を発現しています。一方、人工系では生体系では見られないような機能性分子も開発されています。本研究室では、生体高分子（特にモノクローナル抗体）と人工高分子/低分子との複合化により、それぞれの長所を融合した優れた機能性材料や、今までに無いような新機能を有する材料の創製を目指します。さらに、生体分子の分子レベルにおける構造的エッセンスを抽出し、これを代替する分子・高分子を設計・合成します。これらの分子を特異的に集積した材料を創製することにより、新規機能発現を目指します。


機能化抗体の創製

生体系の優れた機能を人工系に導入することにより、新たな機能性材料を創製することを目的として、「多様性」と「特異性」を有する抗体に注目し、研究を行っています。これまでに種々の機能性低分子に結合するテラーメードのタンパク質として、化学的に均一な「モノクローナル抗体」を作製してきました。これらの抗体を用いて新規超分子錯体を合成し、抗体と人工の機能性分子を調和させることにより、人工分子のみでは発現できないような機能を付与することに成功しています。抗体の優れた分子認識能を利用したセンシングシステム、抗体の結合部位を特異な反応制御場として活用したエネルギー変換・触媒システムの構築を目指しています（図1）。



ある物質を特異的に検出するセンサーの開発

爆発物の一つである過酸化アセトン（TATP）に結合するモノクローナル抗体を作製しました。TATPと化学構造が類似する安定なスピロ環化合物を抗原決定基に用いることにより抗TATP抗体を作製することに成功しました。表面プラズモン共鳴法を検出原理とするバイオセンサーにおいて本抗体を利用すると、TATPを特異的に検出することができます（図2）。



生体成分を組み込んだ人工材料の機能化
 ヘモグロビン、ペルオキシダーゼやシトクロム等では、タンパク質が補因子と複合体を形成することでそれぞれ酸素運搬、酸化還元酵素、電子伝達等の機能を発現しています。補因子である金属ポルフィリンとタンパク質中のアミノ酸との配位が重要な役割を担っています。生体由来の鉄ポルフィリンとアミノ酸（L-ヒスチジン）をそれぞれ人工高分子に導入したヒドログルを合成したところ、これらのヒドログルが配位結合により自己集積し、pH応答性の材料接着システムが構築できました（図3）。さらに最近では、タンパク質と補因子をそれぞれ導入したヒドログルを接着させたり離したりして補因子含有タンパク質の機能を制御する研究も行っています。



（図3）鉄ポルフィリングル（黒褐色）とL-ヒスチジングル（赤色染色）との自己集積体形成

生体由来の分子と人工系で用いる合成分子をうまくハイブリッド化すると、今までに知られていなかった新しい機能が見つかかもしれません。
 体験しましょう、新しい世界を。

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
 大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
 TEL: 06-6850-5460
 FAX: 06-6850-5457



研究室のHPはこちら

36.

高分子溶液学研究室

理学研究科



教授 寺尾 憲 (Ken TERAO)

Laboratory of Macromolecular Solutions

URL: <https://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/lab/terao/>

溶液中における高分子は、その分子形態に高い自由度をもち、無限に近い数の分子形態をとることができます。このため、高分子は低分子にはない様々な特徴をもちます。たとえば高分子内、そして溶媒分子との弱い相互作用により、高分子の分子形態が様々に変化します。さらに水素結合や静電相互作用などの強い分子内相互作用があると、ミセルやベシクル、そして微小な濃厚相液滴などの複雑な構造を形成します。また溶媒分子を介した高分子間の相互作用は、さまざまな相分離を引き起こします。このような現象は生体高分子が示す機能とも相関しています。高分子溶液が示す様々な特性を明らかにするために、当研究室では溶液中における1本の高分子鎖からその集合体、ナノ粒子などとの複合体形成挙動、そして高分子溶液の相分離現象などを、各種散乱法および分光法をはじめとした最新の分析手法を駆使して明らかにすることを目的に研究しています。

多重らせん多糖の解離・会合機構


DNAやコラーゲンなど、生体中で多重らせん構造を形成して機能を発現している高分子は多くあります。塩水溶液中で剛直な二重らせん構造を持つザンサンという多糖は、その剛直さゆえに少量で安定した粘性を水溶液に付与することができるため、増粘剤として食品に広く用いられています。このザンサン－塩化ナトリウム水溶液について、急激な温度変化に伴う二重らせん構造の融解および再形成過程を小角X線散乱(SAXS)、円二色性(CD)測定によって調べると、特殊な中間構造を経て分子形態が変化することがわかりました(図1)。多重らせんを一度ほどいてから再度形成させると、ヘアピン構造や分岐構造などの特殊な構造ができることも分かっており、それによって食感等にも影響を与えます。私たちは、多重らせん構造形成解離挙動を制御することによって、多重らせん多糖にどのような物性・機能が付与できるかについて調べています。

環状・分岐構造をもつ高分子特性

プラスミドなどの環状高分子は遺伝発現など生体内で重要な役割を果たします。環状高分子に特異的な分子間相互作用や機能性について調べるために、剛直な多糖誘導体を調製して、分子形態や分子間相互作用の特徴を調べました。低分子との相互作用が通常の線状鎖とは大きく異なることを見出しました。さらに、濃厚溶液の液晶相中では分子が自発的に折りたたまれることも発見しました(図2b)。環状構造と並んで分岐構造も生体高分子(特に多糖)にはよく見つかりますが、当研究室では環状構造のほかに分岐構造によって生み出される高分子の未知の性質についても研究を進めています。

生体を構成している高分子独特の考え方や性質について基礎から勉強、研究し、未知の面白い現象を見ましょう。

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-1
大阪大学大学院 理学研究科 生物科学専攻
TEL:06-6850-5461



研究室のHPはこちら




図1. 急加熱、急冷に伴うザンサン分子のコンホメーション変化の模式図とその時定数




図2. 剛直な環状高分子が濃厚溶液中で取りうる分子形態の模式図

